

**BSV LEGUMES**

ALSACE .....	2
ASPERGES.....	2
2 Mouche de l'asperge.....	2
3 Mouche mineuse.....	2
4 Criocère de l'asperge.....	2
OMBELLIFERES .....	3
2 Mouche de la carotte .....	3
3 Septoriose .....	4
CHOUX.....	5
2 Altises .....	5
3 Pucerons.....	5
4 Mouche du chou .....	6
5 Chenilles phytophages .....	6
7 Charançon gallicole .....	8
POMMES DE TERRE.....	11
2 Doryphore .....	11
3 Pucerons.....	12
4 Jambe noire.....	13
5 Mildiou .....	13
6 Alternaria.....	15
LORRAINE .....	17
LAITUE DE PLEIN CHAMP .....	17
POMME DE TERRE.....	18
2 Mildiou .....	18
3 Doryphores.....	19
SOLANACEES SOUS ABRI .....	20
CRUCIFERES.....	21



## 1 Description du réseau

En cours de construction. Pour la majorité des producteurs, les récoltes se sont terminées pour le week-end de la Fête des mères. Au 15 juin, toutes les récoltes sont terminées en Alsace. Début de *Stemphylium* sur les plantations non récoltées en 2020, notamment les parcelles en seconde pousse. Mais faible progression avec les températures estivales et la faible hygrométrie de cette semaine, ce qui change avec l'arrivée de séries pluvieuses. Apparition de foyers de rouille sur des plantations non récoltées en 2020.

## 2 Mouche de l'asperge

Le vol touche à sa fin. Quelques dégâts sont visibles sur des parcelles, mais plutôt faibles, exceptées quelques parcelles fortement touchées.



*Mouche de l'asperge*

## 3 Mouche mineuse

L'adulte est une petite mouche d'un noir luisant de 2,5 à 3,5 mm de longueur. Les larves de la mouche mineuse de l'asperge creusent des galeries sinueuses dans les tiges, juste en-dessous de l'épiderme, généralement au voisinage de la base du plant.

Quelques dégâts commencent à se faire voir comme des dessèchements de pieds. Mais souvent sans trop d'incidence. Pas de seuil défini.



*Mouche mineuse - Ophiomyia simplex*

## 4 Criocère de l'asperge

Ils sont toujours présents, mais en régression dans bon nombre de parcelle. A surveiller notamment dans les jeunes parcelles. L'invasion se fait en général par les pourtours des parcelles. Surveiller régulièrement vos parcelles, une fois toutes les semaines.

Les dégâts sont impressionnants, l'épiderme vert des rameaux est littéralement brouté par les larves. Les dégâts démarrent toujours par le haut du feuillage. Ce sont essentiellement les jeunes plantations de l'année, ainsi que les plantations non récoltées qui sont concernées.

Il existe un seuil à partir duquel il est risqué de laisser les populations se développer sur les stades juvéniles de l'asperge. Ce seuil est estimé à 3 criocères pour 10 mètres linéaires de rang (source Adar Blayais en Gironde).



**Criocères adultes**



### 1 Description du réseau

Le réseau est constitué de 4 parcelles à ce jour :


Nom parcelle	Lieu	Culture	Stade (BBCH)	Relevé
Sélestat Carotte S13	Sélestat	Carotte	40% taille finale (45)	06/07
Niedernai Carotte S12	Niedernai	Carotte	40% taille finale (45)	06/07
Mussig Céleri S20	Mussig	Céleri	10 feuilles (41)	06/07
Zimmersheim Carotte S16	Zimmersheim	Carotte	30% taille finale (45)	06/07

### 2 Mouche de la carotte

#### a. Observations

Le vol de la mouche de la carotte est suivi par piégeage des adultes. Un piège est constitué de 3 plaques engluées, disposées entre 5 à 10 mètres les unes des autres.

### Relevé des vols de la mouche de la carotte



Le seuil de nuisibilité a été atteint à Mussig et Sélestat et est très proche à Niedernai. Nous sommes donc en période active de vol de la mouche en plaine même si ce vol ne semble pour l’instant pas très important. Pour Zimmersheim dans le Sundgau, il n’y a pas eu de piégeage de mouche cette semaine. Le vol n’a donc pas encore commencé dans les zones plus tardives.

#### b. Seuil indicatif de risque

Le seuil est atteint quand une mouche est piégée en moyenne sur chacune des plaques engluées par semaine. Ramené à un nombre de mouches par jour, le seuil indicatif de risque est de 0,14.

#### c. Analyse de risque

**Niveau de risque : élevé en plaine, faible dans le Sundgau.**

#### d. Méthodes alternatives

Le sol humide favorise les pontes. Le risque est moins important sur les parcelles non irriguées car un grand nombre d'œufs se dessèchent.

La mise en place de filets anti-insectes et/ou le décalage des semis permettent d'éviter les pontes.

Les bâches de forçage constituent une barrière efficace contre les attaques de mouches dans les parcelles de céleri précoces.

### 3 Septoriose

#### a. Observations

Il n'y a pas d'attaque de septoriose observée pour le moment sur les cultures.

#### b. Seuil indicatif de risque

Les modèles annoncent que la deuxième génération est maintenant partout en cours, sauf à Sainte Croix en Plaine. Les contaminations ont eu lieu sur toutes les stations ainsi que des sorties de taches ce matin sauf à Sainte Croix en Plaine.

Station météo	Génération	Contamination	Prévision	Sortie de taches	Prévision
Duttlenheim	2	2 juillet	-	2 au 5 juillet	
Valff	2	-	-	1 au 3 juillet	
Muttersholtz	2	2 juillet	-	2 et 4 juillet	
Sainte Croix en Plaine	1	-	-	-	

#### c. Analyse de risque

Niveau de risque : **faible**, en baisse avec le temps estival.



## 1 Description du réseau

Les températures annoncées sont propices au développement des choux, cependant il n'y a pas ou très peu de précipitations prévues pour les 10 jours à venir, les irrigations doivent donc se poursuivre. En effet, les besoins journaliers en eau pour une variété demi-tardive de chou à choucroute varient entre 5 et 8 mm par jour en fonction de la température. La pression en ravageur diminue dans les parcelles, les pontes de piérides et les altises restent cependant toujours observées. Les maladies fongiques sont en parallèle en légère hausse.

## 2 Altises

### a. Observations

La population reste faible en majorité, cependant dans certaines parcelles flottantes, on note une augmentation des altises. Le temps ensoleillé et sec est propice à leur prolifération. La surveillance doit donc se poursuivre sur les choux à des stades inférieurs à 10 feuilles.

### b. Seuil indicatif de risque

A partir de 5 individus, les jeunes plants peuvent être endommagés. Les dégâts sont proportionnels à l'attaque et varient selon le stade du chou.

### c. Analyse de risque

Le ravageur apparaît généralement 8 à 10 jours après plantation. Le chou y est extrêmement sensible au moment de la reprise car il ne possède pas encore de surface foliaire suffisante pour compenser les dégâts causés par leurs morsures.

**Niveau de risque** : **moyen à élevé** sur jeune plantation.

### d. Méthodes alternatives

Contrôle des adventices avant plantation pour limiter l'alimentation des adultes qui sortent d'hivernation.

Binage régulier (perturbe le développement des altises).

Irrigation régulière (les altises préfèrent un temps chaud et sec).

Plantes pièges : les choux chinois ainsi que les radis sont des plantes pièges idéales. Placés à quelques mètres de la culture, elles vont attirer les altises.

Pose de filet anti-insectes. A installer sur cultures exemptes d'altises ([lien](#)).

## 3 Pucerons

### a. Observations

Les pucerons sont globalement maîtrisés sur l'ensemble des parcelles du réseau. Aucune nouvelle infestation n'a été décelée.

### b. Seuil indicatif de risque

Pas de seuil de risque connu, les dégâts sont proportionnels à l'attaque et augmentent avec le temps.

### c. Analyse de risque

Le développement des pucerons cendrés peut être rapide et exponentiel si les conditions leur sont favorables. Leur présence est facilement décelable grâce aux zones de décolorations blanches à violettes qu'ils engendrent sur les feuilles (généralement suivies de déformations).

**Niveau de risque** : **faible**

### d. Méthodes alternatives

Contrôle des adventices de la famille des crucifères et des déchets de cultures de choux précédentes sur lesquels les pucerons passent l'hiver.

Favoriser la présence d'auxiliaires (coccinelle, syrphes, chrysope etc, ...), qui peuvent suffire à contrôler les foyers installés par la mise en place de bandes fleuries.

Pose de filet anti-insectes, à installer sur cultures avant l'arrivée des premiers adultes ([lien](#)).

**Biocontrôle** : utilisation de desséchants (dessiccation de la cuticule des insectes à corps mous).

Liste des produits disponibles sous <https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-110>

## 4 Mouche du chou

### a. Observations

Aucune ponte n'a été détectée cette semaine, on peut s'attendre à une modification imminente puisque le second vol devrait avoir débuté. La protection des plants avant plantation est toujours nécessaire.

### b. Seuil indicatif de risque

Sur jeunes plants, les œufs sont déposés par paquets dans le sol ou à proximité du collet de la plante et mettent 4 à 6 jours pour éclore. Les larves vont s'enfoncer dans le sol et creuser des galeries dans les racines provoquant le dépérissement de la plante. Des pontes peuvent avoir lieu 2 à 3 fois pendant la saison, la première génération de larves est la plus destructrice.

### c. Analyse de risque

La phase de sensibilité du chou, lors de la reprise du plant, peut durer de 4 à 8 semaines selon la vitesse de développement de la culture.

**Niveau de risque** : **moyen à élevé** sur plants non traités.

### d. Méthodes alternatives

Les mesures sont uniquement préventives en protégeant les plants avant plantation, une fois les larves et les dégâts observés, il est trop tard pour agir. Pose de filet anti-insectes, à installer sur cultures avant l'arrivée des premiers adultes ([lien](#)).

## 5 Chenilles phytophages

### a. Observations

**Piérides** : le nombre de papillons de piérides volant dans les parcelles est en légère baisse, mais des pontes sont toujours détectées (5 à 20 % des choux avec au moins 1 ponte). Suite aux nombreuses pontes observées depuis 2 semaines, le nombre de larves est en hausse (16 % des choux avec au moins 1 larve sur chou à inflorescence). Quelques pontes de la piéride du chou ont également été décelées en parcelle flottante.

**Teignes** : le nombre de teigne adulte piégé est en légère hausse (20 à 31 individus capturés). Le nombre de larve observé reste toujours sporadique en parcelle flottante (aucune larve observée au sein du réseau).

**Noctuelles** : on relève quelques pontes de noctuelle en parcelle flottante mais aucun adulte n'a été capturé dans les pièges. La présence de larve est également très faible dans l'ensemble.

La situation pour les chenilles phytophages peut varier d'un champ à l'autre, une surveillance régulière des parcelles est indispensable.



Papillon de piéride à gauche, ponte de la piéride du chou au milieu et ponte de la piéride de la rave à droite (A. Claudel)



Différents stades larvaires de la piéride de la rave (A. Claudel)

### b. Analyse de risque

Les larves de teignes sont très petites et difficilement détectables, elles peuvent provoquer des dégâts importants dans un laps de temps très court en particulier lorsqu'elles se trouvent dans le cœur du chou. Les chenilles de noctuelles et de piérides âgées se nourrissent de morceaux plus importants laissant de gros trous irréguliers.

**Niveau de risque** : **moyen** à **élevé** pour la piéride de la rave.

### c. Méthodes alternatives

Contrôle des adventices de la famille des crucifères et des déchets de cultures de choux précédentes qui favorisent la présence des teignes adultes.

Pose de filet anti-insectes, à installer sur cultures avant l'arrivée des adultes et des pontes ([lien](#)).

**Biocontrôle** : les Bt agissent sur jeunes chenilles par ingestion. Etant photosensibles et lessivables, il est important de l'appliquer lors de journées couvertes ou en soirée et en dehors des pluies.

Liste des produits disponibles sous  
<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-110>

## 6 Aleurodes

### a. Observations

Les populations ont augmenté cette dernière semaine sur chou à inflorescence (1 à plus de 20 individus par plante sur 100 % des choux observés). Sur chou pommé, des adultes et des pontes sont toujours détectés mais en quantité moindre, seules les cultures dites « sensibles » sont à risque : chou de Milan, chou à inflorescence, chou de Bruxelles et chou kale. Sur chou pommé type hors chou de Milan type chou blanc (dont chou à choucroute) et chou rouge, elles sont généralement sans conséquence pour la culture.

### b. Seuil indicatif de risque

Les larves et les adultes affaiblissent la plante par leur piqûre (prélèvement de sève), mais c'est surtout l'apparition de fumagine qui est le plus dommageable pour le chou. Il s'agit d'un champignon noir qui se développe sur le miellat excrété par les aleurodes, il bloque la photosynthèse de la plante et provoque des souillures entraînant le déclassement du produit.

### c. Analyse de risque

**Niveau de risque** : **moyen** à **élevé** (sur culture sensible).

### d. Méthodes alternatives

Contrôle des adventices de la famille des crucifères et des déchets de cultures de choux sur lesquels le ravageur passe l'hiver. Pose de filet anti-insectes, à installer sur cultures avant l'arrivée des premiers adultes ([lien](#)).

**Biocontrôle** : utilisation de desséchants (dessiccation de la cuticule des insectes à corps mous).

Liste des produits disponibles sous

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-110>

## 7 Charançon gallicole

### a. Observations

Leur présence semble avoir fortement diminué suite aux interventions (moins de 10 % des plantes avec au moins 1 charançon). On peut toutefois encore les observer sur certaines parcelles flottantes. Ils engendrent des dégâts parfois importants par les trous qu'ils provoquent dans le feuillage en particulier sur les choux au stade début de pomaison (dégât comparable à ceux de la teigne).

### b. Seuil indicatif de risque

Pas de seuil de risque connu.

### c. Analyse de risque

Leur présence est habituellement sporadique et passe inaperçue. Leur évolution est donc à surveiller compte tenu des dégâts qu'ils engendrent en particulier sur jeune plantation et de leur vitesse de propagation.

**Niveau de risque** : **faible** à **moyen** sur chou au stade inférieur à 50% de pomaison.



Charançon de la tige du colza (1<sup>ère</sup> photo) et charançon du chou (les 2 photos suivantes) (A. CLAUDEL)


## 8 Thrips

### a. Observations

Peu d'évolution cette semaine des adultes sont sur chou à choucroute précoce (notamment Almanac) dans une parcelle du réseau. Le temps chaud et sec annoncé pour les jours à venir est propice à leur prolifération. Des Aeolothrips (thrips auxiliaires qui se nourrissent des larves de thrips) sont également décelés.

### b. Analyse de risque

Avec les températures annoncées, leur prolifération va s'accélérer sur les choux qui ont une pomaison avancée, en particulier les variétés Almanac et Tobia ainsi que les choux légumes précoces. Le quatrième vol est en cours.



Thrips adulte à gauche, Aeolothrips (auxiliaire) à droite (A. Claudel)

**Niveau de risque** : **moyen** sur chou avec une pomaison avancée.

### c. Méthodes alternatives

Les pluies ou les irrigations régulières peuvent permettre de lessiver les individus et de contrôler la pression présente.

**Biocontrôle** : utilisation de desséchants (dessiccation de la cuticule des insectes à corps mou).

Liste des produits disponibles sous <https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-110>

## 9 Maladies fongiques et bactériennes

### a. Observations

Du Xanthomonas a été observée sur chou à choucroute en parcelle flottante mais le nombre de cas détecté reste cependant faible pour le moment. Suite aux pluies et aux orages on note en revanche une augmentation de la fréquence de plante avec du mildiou. Les tâches se situent sur les feuilles basses pour le moment. Sur chou à inflorescence il faut veiller à ce que le champignon ne se développe pas dans l'inflorescence. Sur chou à choucroute les symptômes restent généralement sur les feuilles basses. Les parcelles restent cependant globalement saines pour le moment.

### b. Analyse de risque

Les irrigations ainsi que les dégâts engendrés par les ravageurs (altises, pucerons, chenilles phytophages et charançon) sont propices à l'installation des maladies fongiques et bactériennes. Une surveillance renforcée est donc nécessaire en particulier sur les choux dont la pomaison est supérieure à 50% de la taille finale

**Niveau de risque** : **faible à moyen**



Mildiou sur chou pommé. A gauche symptômes sur la face supérieure de la feuille.  
A droite symptômes sous la feuille : sporulation blanche du champignon (A. Claudel)



Xanthomonas sur chou pommé, lésion en forme de V (A. Claudel)



## 1 Description du réseau

Le réseau est constitué de 7 parcelles dans les différents secteurs de production :

Obernai : Annabelle AB, broyé, 0 mm, sol sec, doryphores, virus Y

Obernai : Adora, taille finale, doryphore et coccinelles

Obernai : Monalisa, 60 % de la taille finale, doryphores, pucerons et coccinelles

Muttersholtz : Marabel, 60 % de la taille finale, 25 mm, sol humide, nécroses

Wolfgantzen : Charlotte AB, fin floraison, 25 mm, larves doryphore, virus Y, sol ressuyé

Kappelen : Laura, 90 % floraison, 4 mm, sol sec

Burnhaupt le Haut : Adora, broyé, sol sec

Les plantations de primeurs ont eu lieu à la mi-mars. Elles ont été suivies de celles de variétés de conservation. Les cultures sont poussantes avec la hausse des températures, toujours favorables aux ravageurs (nouveaux doryphores adultes). Les primeurs non bachées sont au stade maturité à sénescence (poursuite des broyages et défananges). Les plantations pour la conservation sont au stade fin floraison ou maturité (en avance en raison du climat et du stress). Le développement du feuillage est très variable selon l'eau disponible, avec souvent difficulté à couvrir le sol. Présence de punaises vertes ou noires localement.



Virus Y sur feuille à gauche sur Annabelle, à droite, Adora à maturité avec alternaria. (D. Jung)

## 2 Doryphore

### a. Observations

Les observations d'adultes en parcelle sont stables (deuxième génération déjà), avec moins de présence de foyers de larves dans le réseau ou hors réseau, avec dépassement du seuil dans les parcelles plus protégées.

### b. Seuil indicatif de risque



En conventionnel : 2 foyers sur 1 000 m<sup>2</sup>. En bio : 30 % des plantes avec les larves. Surveiller les bordures et les plantes plus faibles, qui sont attaquées en premier.



général  
mm  
feuilles  
à 30

L1 ou L2

L3 ou L4

Enterrement  
d'une L4

### c. Analyse de risque

En présence des larves, surveiller leur taille pour viser les stades L1 et L2. Les températures estivales et le peu de pluies facilitent leur activité. Les dégâts

augmentent avec la taille et le nombre de larves présentes.

**Niveau de risque** : **élevé** en présence de pontes ou d'adultes.

### d. Méthodes alternatives

Rotations culturales longues.

Éliminer les adultes et les repousses qui assurent la multiplication.

**Biocontrôle** : des produits agissent sur larves par ingestion. Étant photosensibles et lessivables, il est important de l'appliquer lors de journées couvertes ou en soirée et en dehors des pluies.

## 3 Pucerons

### a. Observations

Des aptères ne sont presque plus présents. Les auxiliaires syrphes adultes, araignées) sont encore présents. Leur présence ou celles de fourmis également observées sur une parcelle donnent une indication de présence de pucerons, à observer (avec une loupe si besoin) sous les feuilles, dans les étages foliaires inférieurs en premier.

### b. Seuil indicatif de risque

Méthode simplifiée : 20 folioles sur 40 sont porteuses de larves de pucerons.

### c. Analyse de risque

Les ailés permettent une dissémination rapide et une installation dès la levée sous les feuilles (du bas de préférence). Les aptères vont prélever de la sève, ce qui affaiblit la plante et permet la transmission de viroses, visibles maintenant dans plusieurs situations. Le miellat produit attire des fourmis, facilement visibles.

**Niveau de risque** : **faible**. Les températures et les pluies ont réduit leur activité, qui reste présente. Surveiller leur développement, notamment sur les variétés sensibles au virus Y. Et aussi l'arrivée suite aux moissons.

### d. Méthodes alternatives

Aucune méthode alternative efficace. Pour la production de plants, des huiles sont utilisables (également certaines en AB).

**Biocontrôle** : des produits existent, appliqués régulièrement, ils forment un film continu qui préserve des piqûres.



Larves et adulte de pucerons (D. JUNG)

## 4 Jambe noire

### a. Observations

Les sols humides favorisent l'apparition des lenticelles ouvertes, qui sont des portes d'entrée des bactéries (comme des blessures provoquées par le rhizoctone ou des morsures de limaces, observées sur tubercule sur plusieurs parcelles, des chocs par le buttage). Les températures élevées sont favorables à l'apparition des symptômes de flétrissement (parfois dues à la verticilliose).



### b. Seuil indicatif de risque

Pas de seuil. Les dégâts sont proportionnels au nombre de plantes atteintes et à la précocité de l'attaque. Les tubercules formés peuvent également être atteints et pourrir.

### c. Analyse de risque

Un temps humide de plus de 24 h permet la dissémination de la bactérie.

**Niveau de risque** : faible.

### d. Méthodes alternatives

Limiter les chocs lors des interventions mécaniques.  
La suppression des plants pourris limite la dissémination.

**Biocontrôle** : des produits peuvent être appliqués lors de périodes humides évite la dissémination au reste de la parcelle.

## 5 Mildiou


### a. Observations

Attention à la confusion avec les brûlures dues au soleil (effet loupe), au frottement par le vent, des apports d'engrais, et surtout avec le botrytis (plusieurs cas observés ou signalés semaines passées). Pas de cas recensés de mildiou.

### b. Seuil indicatif de risque

Pas de seuil de nuisibilité, la protection est préventive. Les dégâts sont proportionnels au nombre de plantes atteintes et à la précocité de l'attaque, qui peut être fulgurante. Les tubercules formés peuvent également être atteints et pourrir.

Le modèle Mileos® d'Arvalis Institut du Végétal permet la modélisation du risque de la maladie selon la sensibilité variétale du feuillage en fonction des contaminations et des sporulations suivantes). Il faut que la parcelle ait atteint les 30 % de plants levés pour prendre en compte le risque mildiou.



Tache de mildiou (D. JUNG)

### c. Analyse de risque

Les contaminations et l'évolution de la maladie dépendent des températures et de l'humidité. Ainsi, les conditions climatiques idéales pour le développement du mildiou sont d'abord une succession de périodes humides et assez chaudes (un optimal de 18-22°C) pour la formation des spores. La germination des spores est ensuite possible dès que la durée d'humectation du feuillage est égale à 4 heures et plus, assortie de températures comprises entre 3-30°C (optimal 8-14°C). Par la suite, les pluies, les hygrométries supérieures à 90% associées à des températures comprises entre 10-25°C favorisent l'évolution de la maladie. En revanche, des températures négatives (-2°C) ou bien à l'inverse celles supérieures à 30°C limitent ou bloquent le développement du champignon.

**Niveau de risque** : nul. L'humidité nocturne suite aux pluies passées a favorisé les contaminations et les sporulations. Les températures élevées limitent la survie des spores. Le risque peut être plus élevé quand la culture couvre le sol, dans les zones abritées, humides (rivières, étangs), bâchées ou irriguées. Les cycles de développement vont de 5 à 15 jours.

Le tableau suivant présente les seuils de risque par type de sensibilité variétale. Le poids de contamination correspond au nombre de spores présentes dans l'environnement et à leur capacité à germer.

Niveau de risque de contamination	Insuffisant	Faible	Moyen	Élevé	Très élevé
Attaque possible sur	Non	Repousse ou plant contaminé/déchet	Variété Sensible	Variété Intermédiaire	Variété Résistante
Poids de contamination	Nul	Inférieure à 2	Supérieure à 2	Supérieure à 3	Supérieure à 4

Le tableau suivant donne la situation du modèle Mileos pour 4 stations météo, valable dans un rayon de 7 à 10 km selon la topographie, sur les 7 derniers jours pour l'atteinte du seuil variétal.

Stations météo	Le seuil de nuisibilité est atteint si le poids de contamination >2								Précipitations cumulées sur la période (mm)
	30 juin	1 <sup>er</sup> juillet	2 juillet	3 juillet	4 juillet	5 juillet	6 juillet	7 juillet	
Duttlenheim	0	5,11	0	0	0	0	0	0	1,0
Muttersholtz	0	0,77	0	0	0	0	0	0	1,0
Valff	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Geispitzen	0	0,92	0	0	0	0	0	0	9,2

Le seuil de nuisibilité (nombre de spores qui contaminent supérieur au seuil de sensibilité variétale) a été atteint pour toutes les variétés le 1 juillet à Duttlenheim. Le poids de contamination (nombre de spores qui contaminent) est nul depuis jeudi dernier et pour les 2 jours à venir. La réserve de spores insuffisante pour une contamination dans les 48 heures avec un index insuffisant partout, sauf à Duttlenheim les 9 et 10 juillet. Ailleurs, le risque peut être plus élevé, surtout pour les primeurs ou en irrigué. Le potentiel de sporulation est suffisant partout pour les 48 h à venir pour une contamination.

#### d. Méthodes alternatives

Élimination des tas de déchets de triage et des repousses de pommes de terre.

Utilisation de plants sains.

Planter des variétés moins sensibles.

Éviter les longues périodes d'humidité (irrigation en cours de journée, drainage, aération).

Pratiquer une rotation supérieure à 3 ans.

**Biocontrôle** : des produits peuvent être appliqués avant des périodes humides protégé de façon préventive des contaminations.

## 6 Alternaria

### a. Observations

De l'alternaria s'observe sur les primeurs en fin de cycle et sur Charlotte ou Marabel non irriguée ou en stress. La sensibilité est précoce cette année en raison des plantations précoces et de l'avancement du feuillage en situation non irriguée.



### b. Seuil indicatif de risque

Pas de seuil de nuisibilité, la protection est préventive. Les dégâts sont proportionnels au nombre de plantes atteintes et à la précocité de l'attaque, qui peut être rapide. Les tubercules formés peuvent également être atteints et occasionner des pertes de rendement (-15-20 % en Alsace).


### c. Analyse de risque

Pour que l'alternariose se développe, il faut des températures comprises entre 13 et 30°C avec un optimum entre 20 et 22°C. Pour qu'il y ait production de spores, il faut une alternance entre périodes alliant sécheresse et lumière et des périodes alliant obscurité et humectation (rosée). L'alternariose se développe préférentiellement sur les feuilles « âgées » (feuilles du bas), abimées (vent, grêle) et sur les plantes stressées ou carencées. Les années sèches sont également favorables à la maladie. Il y a peu de formation de nouvelles feuilles car la minéralisation est moins bonne.

Dans les parcelles de variétés sensibles à l'alternariose conduites en sec et qui souffrent de stress (stress hydrique, rotations courtes, carence minérale...), on peut voir des symptômes d'*Alternaria alternata*. L'*Alternaria alternata* est un parasite de faiblesse moins virulent que l'*alternaria solani* qui est considéré comme le pathogène (il faut 10 à 100 fois moins de spores de *solani* pour générer une infection que de spores d'*alternata*). L'*Alternaria alternata* émet moins de toxine que le *solani*, il a un impact moins important sur le rendement.

**Niveau de risque : élevé en variété sensible.** L'index de risque 2020 a été réactualisé sur le site du CHU de Strasbourg à la date du 3 juillet pour la semaine 26. Le niveau de spores capturées est élevé et supérieur à la moyenne des années précédentes depuis la semaine 24. Les températures sont favorables et le seuil de sensibilité (la floraison) est atteint pour la plupart des parcelles. Risque plus élevé actuellement avec les orages à venir ou l'irrigation.

## STRASBOURG



Voici des listes non exhaustives de sensibilités variétales à l'alternaria, il faut y rajouter Agata en (très) sensible.

Sensibilité	
Variétés	
Terra Gold	Très peu à peu sensible
Piesto	Très peu à peu sensible
Laura	Très peu à peu sensible
Juliette	Sensible
Spirit	Sensible
Biogold	Sensible
Innovator	Sensible
Claret	Sensible
Désirée	Sensible
Junior	Sensible
Gloria	Sensible
Alpha	Sensible
Bintje	Sensible
Charlotte	Sensible
Orla	Très sensible
Markies	Très sensible
Belana	Très sensible
Désibelle	Très sensible

■ Très peu à peu sensible  
■ Sensible  
■ Très sensible

Source : Centre Wallon de Recherches Agronomiques

AGRIA	BINTJE	FONTANE	LADY CLAIRE	SAMBA
ALPHA	CHALLENGER	GLORIA	MANITOU	SANTANA
AMANDINE	CHARLOTTE	INNOVATOR	MARABEL	SATURNA
AMYLA	DAISY	JUNIOR	MARKIES	...
AZIZA	DESIBELLE	KARDAL	ORLA	
BELANA	DÉSIRÉE	KRONE	RAMOS	



## 1 Stade de la culture/description du réseau

Les observations de cette semaine ont été effectuées sur trois sites sur les secteurs de Pont-à-Mousson, Lunéville et Longwy. Peu de changements sont observés par rapport à la semaine dernière : la situation sanitaire est globalement bonne, bien que les conditions de la semaine passée aient pu favoriser les maladies fongiques (temps chaud et humide). Les ravageurs restent peu présents cette semaine.

## 2 Pucerons

### a. Observations

Aucun foyer de puceron n'a été relevé sur laitue de plein champ sur les sites observés cette semaine. Cependant la situation peut varier fortement d'un site à l'autre et les pucerons sont parfois présents sur d'autres cultures en plein champ. Il faut donc rester vigilant.

### b. Seuil indicatif de risque

Le seuil indicatif de risque est de 10 % des plantes avec au moins un puceron de mi-mai à fin juillet.

### c. Analyse de risque

Le risque dépend du mode de commercialisation (il y a en général plus de tolérance pour de la vente en direct). Il est **faible** à **moyen** en plein champ cette semaine, avec une grande variabilité selon le site considéré et le niveau de développement des auxiliaires.

### d. Méthodes alternatives

Une forte fertilisation azotée augmente la sensibilité des plantes aux pucerons.

Les auxiliaires présents naturellement dans la parcelle peuvent maîtriser efficacement la population de pucerons, à condition qu'ils soient suffisamment développés au moment où survient le risque.

## 3 Botrytis

### a. Observations

Aucun cas de botrytis n'a été signalé cette semaine. Le temps sec prévu pour les prochains jours ne devrait pas favoriser son développement.

### b. Analyse de risque

Le risque est **faible** en plein champ cette semaine.

### c. Méthodes alternatives

Les infections par le botrytis sont favorisées par une forte fertilisation azotée ainsi que par les blessures (y compris des pucerons) qui sont des points d'entrée de la maladie. L'espacement des têtes (10/m<sup>2</sup> au lieu de 12 ou 14) permet d'améliorer la ventilation de la culture et de diminuer la pression. La plantation sur plastique isole les feuilles du sol ce qui limite aussi l'infection.



**Botrytis sur batavia. La sporulation grise est bien visible (H. BEYER)**



## 1 Stade de la culture/description du réseau

Les observations de cette semaine ont été effectuées sur deux sites dans les secteurs de Pont-à-Mousson et Longwy. Les variétés les plus précoces (Monalisa, Allians) sont en fin de floraison et ont des taux de matière sèche autour de 18%. Les pucerons ne sont plus présents mais ont pu faire des dégâts (transmission de viroses). Des doryphores sont en revanche observés. Les auxiliaires, notamment les larves de coccinelles, restent bien présents.



Foyer de doryphores sur MONALISA (L.HUSSON)

## 2 Mildiou

### a. Observations

Aucun symptôme de mildiou n'a été observé cette semaine.

### b. Seuil indicatif de risque

Pas de seuil de nuisibilité, la protection est préventive. Les dégâts sont proportionnels au nombre de plantes atteintes et à la précocité de l'attaque, qui peut être fulgurante. Les tubercules formés peuvent également être atteints et pourrir. Le modèle Mileos® d'Arvalis Institut du Végétal permet la modélisation du risque de la maladie selon la sensibilité variétale du feuillage en fonction des contaminations et des sporulations (voir tableau suivant). Il faut que la parcelle ait atteint les 30 % de plants levés pour prendre en compte le risque mildiou.

### c. Analyse de risque

Les contaminations et l'évolution de la maladie dépendent des températures et de l'humidité. Ainsi, les conditions climatiques idéales pour le développement du mildiou sont d'abord une succession de périodes humides et assez chaudes (un optimal de 18-22°C) pour la formation des spores. La germination des spores est ensuite possible dès que la durée d'humectation du feuillage est égale à 4 heures et plus, assortie de températures comprises entre 3-30°C (optimal 8-14°C). Par la suite, les pluies, les hygrométries supérieures à 90% associées à des températures comprises entre 10-25°C favorisent l'évolution de la maladie. En revanche, des températures négatives (-2°C) ou bien à l'inverse celles supérieures à 30°C limitent ou bloquent le développement du champignon.

#### Niveau de risque :

Le tableau suivant présente les seuils de risque par type de sensibilité variétale. Le poids de contamination correspond au nombre de spores présentes dans l'environnement et à leur capacité à germer.

Niveau de risque de contamination	Insuffisant	Faible	Moyen	Élevé	Très élevé
Attaque possible sur	Non	Plant contaminé/déchet	Variété Sensible	Variété Intermédiaire	Variété Résistante
Poids de contamination	Nul	Inférieure à 2	Supérieure à 2	Supérieure à 3	Supérieure à 4

**Evaluation du risque d'après MILEOS®** Le tableau suivant indique la situation du modèle MILEOS® pour 2 stations météo, valable dans un rayon de 7 à 10 km selon la topographie, sur les 7 derniers jours.

Stations météo	Le seuil de nuisibilité est atteint si le poids de contamination >2							Précipitations cumulées sur la période (mm)	
	30 juin	1 <sup>er</sup> juillet	2 juillet	3 juillet	4 juillet	5 juillet	6 juillet		7 juillet
Lucey	0	4,1	0	0	0	0	0	0	2,5
Crantenoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5

**Niveau de risque : faible sur les stations considérées (cf. tableau).** Après une semaine de risque élevé en raison de conditions humides (cf. dernier BSV), le risque mildiou est désormais revenu en-dessous du seuil de contamination. Les conditions sèches devraient se poursuivre, le risque devrait donc rester faible pour les prochains jours.

#### d. Méthodes alternatives

Élimination des tas de déchets de triage et des repousses de pommes de terre. Utilisation de plants sains.

Planter des variétés moins sensibles.

Éviter les longues périodes d'humidité (irrigation en cours de journée, drainage, aération).

Pratiquer une rotation supérieure à 3 ans.

**Biocontrôle** : des produits appliqués avant des périodes humides protègent de façon préventive des contaminations.



Il ne faut pas confondre le mildiou avec d'autres maladies notamment le botrytis

### 3 Doryphores

#### a. Observations

Les doryphores sont présents sur les deux sites observés, il s'agit de la seconde génération de larves. Des adultes sont également encore présents.

#### b. Seuil indicatif de risque

En conventionnel : 2 foyers sur 1 000 m<sup>2</sup> (un foyer = 1 à 2 plantes avec env. 20 larves de la taille d'un grain de blé).

En bio : 30 % des plantes avec les larves. Surveiller les bordures pour détecter de façon précoce.



De gauche à droite : larve L1, L2 et L3 de doryphore. Source : [www.insectes-net.fr](http://www.insectes-net.fr)

### c. Analyse de risque

Le risque est **moyen** à **élevé** en présence de larves défoliatrices. Le risque va ensuite augmenter avec la taille des larves.

### d. Méthodes alternatives

Rotations culturales longues.

Éliminer les adultes et les repousses qui assurent la multiplication.

Attention aux dernières générations qui forment l'inoculum de l'année suivante.

**Biocontrôle** : des produits agissent sur larves par ingestion. Étant photo-sensibles et lessivables, il est important de l'appliquer lors de journées couvertes ou en soirée et en dehors des pluies.

## SOLANACEES SOUS ABRI

### 1 Stade de la culture/description du réseau

Les observations de cette semaine pour les solanacées et cucurbitacées sous abri ont été faites sur trois sites sur les secteurs de Pont-à-Mousson, Lunéville et Longwy. Les tomates observées ont pour les plus avancées leur 7<sup>ème</sup> bouquet formé, et les récoltes commencent cette semaine sur le site le plus tardif. La situation change peu par rapport au dernier BSV : les pucerons sont toujours présents, surtout sur cucurbitacées, avec cependant une pression moins forte que les semaines précédentes. Les auxiliaires sont également très présents et ont souvent permis de maîtriser le risque puceron. Aucune maladie fongique n'a été observée cette semaine.

### 2 Pucerons

#### a. Observations

Peu de pucerons ont été observés cette semaine sur solanacées et cucurbitacées. Quelques foyers sont observés sur aubergine, mais les auxiliaires présents permettent de maîtriser leur développement. Ils sont également présents sur melon sur un site. Sur les autres cultures (poivron, tomate, concombre, courgette), aucun foyer de puceron n'a été relevé. Il faut cependant rester vigilant, car la situation peut varier fortement d'un site à l'autre et dépend du développement des auxiliaires.



Colonie en développement de pucerons verts sur aubergine  
(H. BEYER)



Larve de coccinelle et pucerons parasités  
(momies beige-doré) sur feuille d'aubergine  
(L. HUSSON)

#### b. Analyse de risque

Le risque reste globalement **moyen**, mais il est variable d'un site à l'autre selon la culture considérée et le niveau de développement des auxiliaires.

### c. Méthodes alternatives

Evitez la surfertilisation qui favorise les pucerons. Restez vigilants sur les aubergines et poivrons qui sont les cultures les plus sensibles.

Certaines préparations ont la capacité de dessécher la peau molle des pucerons sans nuire aux auxiliaires.

L'installation de bandes fleuries ou de plantes riches en nectar favorise la présence des auxiliaires au voisinage des abris, mais surtout à partir de juin.

**Biocontrôle** : en cas de foyer déclaré, des auxiliaires « nettoyeurs » (chrysopes à 5/m<sup>2</sup>) peuvent être utilisés pour compléter les populations d'auxiliaires naturellement présents.

## CRUCIFERES

### 1 Stade de la culture/description du réseau

Les observations sur crucifères pour cette semaine ont été réalisées sur deux sites sur les secteurs de Pont-à-Mousson et Lunéville. Aucun foyer de puceron n'a été observé, et les altises restent globalement peu présentes. Quelques aleurodes sont observés, mais la pression reste faible.

### 2 Altises

#### a. Observations

Peu d'altises ont été observées cette semaine, que ce soit sur de jeunes plants ou sur des choux déjà bien développés. La météo sèche prévue pour pourrait cependant favoriser leur retour, il faut donc rester vigilant sur les jeunes plantations et les jeunes semis.



Dégâts d'altises sur semis (H. BEYER)

#### b. Analyse de risque

Le risque dépend du stade de la culture : il est **moyen à élevé** sur les jeunes plantations et les jeunes semis, et **faible à moyen** sur des cultures déjà plus développées. La présence de colza autour des parcelles favorise leur présence.

#### c. Méthodes alternatives

L'utilisation de filets anti-insectes adaptés montre de bons résultats (cf. [Guide d'utilisation des filets anti-insectes](#)).

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est et de la DRAAF :

<http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/>  
<http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes>

Affinez vos connaissances sur les principales adventices des Grandes Cultures et les méthodes de lutte préventive en consultant le site INFLOWEB : <http://www.infloweb.fr>



Édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture GRAND EST, sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau Légumes :

Arvalis Institut du Végétal, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Gustave Muller, Lycée agricole du Pflixbourg, PLANETE Légumes.

**Rédaction** : PLANETE Légumes.

Relecture assurée par la DRAAF (SRAL).

**Crédits photos** : VisualHunt, PLANETE Légumes.

**Coordination et renseignements** :

Claire COLLOT, Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Tél. : 03 83 96 85 02. Courriel : [claire.collot@grandest.chambagri.fr](mailto:claire.collot@grandest.chambagri.fr)

**Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande sur le site internet de la Chambre d'Agriculture du Grand Est**

<http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/abonnez-vous-gratuitement-a-nos-bsv/>

Action pilotée par le ministère chargé de l'Agriculture, avec l'appui financier de l'Agence Française de Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du Plan ÉCOPHYTO II.