



légumes

Fiche de reconnaissance de la mouche orientale des fruits

<https://bit.ly/3fRN9LI> ou voir à la fin du BSV précédent

BSV n°18 – 19 août 2020

BSV LEGUMES

ALSACE	2
ASPERGES	2
2 Mouche mineuse.....	2
3 Criocère de l'asperge.....	2
4 Vers gris	2
5 Stemphylium	2
6 Rouille.....	3
OMBELLIFERES	4
2 Mouche de la carotte	4
3 Septoriose	6
CHOUX.....	7
2 Altises	7
3 Mouche du chou	8
4 Chenilles phytophages	8
POMMES DE TERRE.....	12
2 Mildiou	12
3 Alternaria.....	13
LORRAINE	15
LAITUE DE PLEIN CHAMP	15
POMME DE TERRE.....	16
2 Mildiou	16
3 Doryphores.....	17
SOLA.....	18
CRUCIFERES.....	21



1 Description du réseau

Les plantations 2020 sont globalement belles. Les reprises ont été exceptionnelles au mois d'avril. Les situations sans irrigation ou avec retard pour la mise en route sont plus hétérogènes. La seconde, voire 3^{ème} pousse, est en cours d'émergence.

Pour les parcelles non récoltées en 2020, elles sont bien développées et sont globalement peu malades (stemphylium et parfois rouille). Mais il y a aussi des jaunissements physiologiques liés à la maturité de la première pousse, variables selon les variétés.

Pour les parcelles récoltées, les parcelles ayant été arrêtées en mai sont bien vigoureuses. Celles qui ont été arrêtées fin mai ou début du mois de juin étaient plus chétives jusqu'à la semaine dernière. La seconde pousse qui arrive actuellement est vigoureuse, les parcelles commencent à bien s'épaissir.

2 Mouche mineuse

Quelques dégâts sont visibles comme des dessèchements de pieds. Mais souvent sans trop d'incidence. Pas de seuil défini.

3 Criocère de l'asperge

Ils sont toujours présents, mais en régression dans bon nombre de parcelle. A surveiller notamment dans les jeunes parcelles. L'invasion se fait en général par les pourtours des parcelles. Surveiller régulièrement vos parcelles, une fois toutes les semaines.

Il existe un seuil à partir duquel il est risqué de laisser les populations se développer sur les stades juvéniles de l'asperge. Ce seuil est estimé à 3 criocères pour 10 mètres linéaires de rang (source Adar Blayais en Gironde).



Œufs de criocères



4 Vers gris

Les dégâts de larves de noctuelles ou de vers gris, sont en forte baisse. Quasiment plus de signalement de dessèchement de turions.

Larves de vers gris

5 Stemphylium

Le *Stemphylium* progresse notamment sur les parcelles non récoltées en 2020. Les conditions actuelles ne sont pas favorables à son développement dans bon nombre de situations, exceptées dans les parcelles avec irrigation par aspersion.

Les parcelles situées en fond de vallée, le long d'une rivière, sont plus exposées au stemphylium, car le feuillage reste plus humide le matin.

6 Rouille

Pour la rouille, les foyers sont plus restreints, mais la progression de ces foyers est parfois exponentielle. En général, présence de rouille en situation stressante en termes d'eau, sol sableux. Les parcelles atteintes en 2019 par la rouille sont beaucoup plus exposées à cette maladie en 2020.





1 Description du réseau

Le réseau est constitué de 4 parcelles à ce jour :


Nom parcelle	Lieu	Culture	Stade (BBCH)	Relevé
Sélestat Carotte S22	Mussig	Carotte	10% taille finale (BBCH41)	18/08
Niedernai Carotte S22	Niedernai	Carotte	20% taille finale (42)	18/08
Mussig Céleri S20	Mussig	Céleri	50% taille finale (45)	18/08
Zimmersheim Carotte S16	Zimmersheim	Carotte	10% taille finale (41)	18/08

2 Mouche de la carotte

a. Observations

Le vol de la mouche de la carotte est suivi par un piégeage des adultes. Un piège est constitué de 3 plaques engluées, disposées entre 5 à 10 mètres les unes des autres.

Relevé des vols de la mouche de la carotte



Il n'y a pas de vol de la mouche de la carotte en Alsace puisqu'aucune mouche n'a été piégée dans toutes les zones de relevés : Mussig, Niedernai et Zimmersheim. Il n'y a donc pas de risque en ce moment.

b. Seuil indicatif de risque

Le seuil est atteint quand une mouche est piégée en moyenne sur chacune des plaques engluées par semaine. Ramené à un nombre de mouches par jour, le seuil indicatif de risque est de 0,14.

c. Analyse de risque

Niveau de risque : faible.

d. Méthodes alternatives

Le sol humide favorise les pontes. Le risque est moins important sur les parcelles non irriguées car un grand nombre d'œufs se dessèchent.

La mise en place de filets anti-insectes et/ou le décalage des semis permettent d'éviter les pontes.

Les bâches de forçage constituent une barrière efficace contre les attaques de mouches dans les parcelles de céleri précoces.

3 Septoriose

a. Observations

Les taches de septoriose sont observées sur les parcelles à risque.

b. Seuil indicatif de risque

Le modèle de calcul du risque Septocel (Septoriose du céleri de la DGAL sur la plateforme INOKI du CTIFL) a été validé sur céleri en France. Afin d'initier le démarrage du modèle, la date de repiquage est fixée au 1 mars. Une prévision du risque est calculée sur 5 jours à partir des données des stations météo de Muttersholtz, Duttlenheim, Valff et Sainte-Croix-En-Plaine.

Les modèles annoncent que la quatrième génération est toujours en cours et que la cinquième a démarré à Sainte Croix en Plaine. Des contaminations ont eu lieu 12 août à Muttersholtz et le 15 août à Sainte-Croix-En-Plaine. Des sorties de taches ont eu lieu comme prévu sur la plupart des sites les 14 ou 15 août.

Station météo	Génération	Contamination	Prévision	Sortie de taches	Prévision
Duttlenheim	4		22 août	14 août	
Valff	4		22 août	15 août	
Muttersholtz	4	12 août	22 août	15 août	
Sainte Croix en Plaine	5	15 août	22 août		22 août

c. Analyse de risque

Niveau de risque : **moyen**.



1 Description du réseau

Les averses et la baisse des températures depuis une semaine réduisent le stress des choux en parcelle non irriguée. Les récoltes des variétés précoces de chou à choucroute se poursuivent. Les cas de pourriture molle sur Almanac également, il est recommandé de les sortir rapidement du champ en cas de symptômes détectés. Le vol de piéride et les pontes restent intenses selon les secteurs. Suite à l'augmentation des température prévue demain et vendredi, des infestations d'altises sur chou en pleine pomaison peuvent se reproduire. Des dégâts de corbeaux sont également toujours constatés sur les pommes des choux dans de nombreuses parcelles.



Dégâts de corvidés (A. Claudel)

2 Altises

a. Observations

Leur présence est globalement faible sur les choux suite aux pluies et à la baisse des températures (uniquement 1 à 10 individus à Innenheim sur près de 25 % des plantes). Des attaques sur pomme parfois importantes ont été constatées. La surveillance doit se poursuivre sur les choux à des stades inférieurs à 10 feuilles.

b. Seuil indicatif de risque

A partir de 5 individus, les jeunes plants peuvent être endommagés. Les dégâts sont proportionnels à l'attaque et varient selon le stade du chou.

c. Analyse de risque

Le ravageur apparaît généralement 8 à 10 jours après plantation. Le chou y est extrêmement sensible au moment de la reprise car il ne possède pas encore de surface foliaire suffisante pour compenser les dégâts causés par leurs morsures.

Niveau de risque : **moyen** sur jeune plantation.

d. Méthodes alternatives

Contrôle des adventices avant plantation pour limiter l'alimentation des adultes qui sortent d'hivernation.

Binage régulier (perturbe le développement des altises).

Irrigation régulière (les altises préfèrent un temps chaud et sec).

Plantes pièges : les choux chinois ainsi que les radis sont des plantes pièges idéales. Placés à quelques mètres de la culture, elles vont attirer les altises.

Pose de filet anti-insectes. A installer sur cultures exemptes d'altises.

<http://www.planete-legumes.fr/wp-content/uploads/2016/12/Guide-technique-filets-anti-insectes.pdf>

3 Mouche du chou

a. Observations

Pas de pontes relevées cette semaine, en revanche des dégâts de larves sont constatés sur les pommes des choux récoltées. Maintenir la protection des plants de chou avant plantation est toujours nécessaire.

b. Seuil indicatif de risque

Sur jeunes plants, les œufs sont déposés par paquets dans le sol ou à proximité du collet de la plante et mettent 4 à 6 jours pour éclore. Les larves vont s'enfoncer dans le sol et creuser des galeries dans les racines provoquant le dépérissement de la plante. Des pontes peuvent avoir lieu 2 à 3 fois pendant la saison, la première génération de larves est la plus destructrice.



Dégâts de mouche du chou (A. Claudel)

c. Analyse de risque

La phase de sensibilité du chou, lors de la reprise du plant, peut durer de 4 à 8 semaines selon la vitesse de développement de la culture.

Niveau de risque : **moyen à élevé** sur plants non traités.

d. Méthodes alternatives

Les mesures sont uniquement préventives en protégeant les plants avant plantation, une fois les larves et les dégâts observés, il est trop tard pour agir. Pose de filet anti-insectes, à installer sur cultures avant l'arrivée des premiers adultes. <http://www.planete-legumes.fr/wp-content/uploads/2016/12/Guide-technique-filets-anti-insectes.pdf>

4 Chenilles phytophages

a. Observations

Les vols de papillons de piéride se poursuivent, avec une ponte observée à Innenheim. Des éclosions sont donc à prévoir dans les jours à venir. Une inspection régulière des parcelles reste indispensable. Le nombre de larve de teigne et de noctuelle observé cette semaine remonte.

La situation pour les chenilles phytophages peut varier d'un champ à l'autre, une surveillance régulière des parcelles est indispensable.



A gauche, larve de piéride du chou, au milieu larve de piéride de la rave, à droite papillon de piéride (A. Claudel)

b. Analyse de risque

Les larves de teignes sont très petites et difficilement détectables, elles peuvent provoquer des dégâts importants dans un laps de temps très court en particulier lorsqu'elles se trouvent dans le cœur du chou. Les chenilles de noctuelles et de piérides âgées se nourrissent de morceaux plus importants laissant de gros trous irréguliers.

Niveau de risque : **moyen à élevé** pour les piérides.

c. Méthodes alternatives

Contrôle des adventices de la famille des crucifères et des déchets de cultures de choux précédentes qui favorisent la présence des teignes adultes.

Pose de filet anti-insectes, à installer sur cultures avant l'arrivée des adultes et des pontes <http://www.planete-legumes.fr/wp-content/uploads/2016/12/Guide-technique-filets-anti-insectes.pdf>

Biocontrôle : les Bt agissent sur jeunes chenilles par ingestion. Etant photosensibles et lessivables, il est important de l'appliquer lors de journées couvertes ou en soirée et en dehors des pluies. Liste des produits disponibles sous <https://ecophytopic.fr/protger/liste-des-produits-de-biocontrole>

5 Aleurodes

a. Observations

Des adultes et des pontes sont toujours présents sur les cultures sensibles (chou à inflorescence, chou de Milan, chou kale et chou de Bruxelles), la pression reste importante (100% des choux avec au moins 5 individus par plantes sur la parcelle du réseau). Sur chou pommé type hors chou de Milan type chou blanc (dont chou à choucroute) et chou rouge, elles sont généralement sans conséquence pour la culture, même si leur présence est importante cette semaine.



Aleurodes (A. Claudel)

b. Seuil indicatif de risque

Les larves et les adultes affaiblissent la plante par leur piqûre (prélèvement de sève), mais c'est surtout l'apparition de fumagine en cas d'attaque massive en été qui est le plus dommageable pour le chou. Il s'agit d'un champignon noir qui se développe sur le miellat excrété par les aleurodes, il bloque la photosynthèse de la plante et provoque des souillures entraînant le déclassement du produit.

c. Seuil indicatif de risque

Les larves et les adultes affaiblissent la plante par leur piqûre (prélèvement de sève), mais c'est surtout l'apparition de fumagine en cas d'attaque massive en été qui est le plus dommageable pour le chou. Il s'agit d'un champignon noir qui se développe sur le miellat excrété par les aleurodes, il bloque la photosynthèse de la plante et provoque des souillures entraînant le déclassement du produit.

d. Analyse de risque

Niveau de risque : **élevé** (sur culture sensible).

e. Méthodes alternatives

Contrôle des adventices de la famille des crucifères et des déchets de cultures de choux sur lesquels le ravageur passe l'hiver. Pose de filet anti-insectes, à installer sur cultures avant l'arrivée des premiers adultes <http://www.planete-legumes.fr/wp-content/uploads/2016/12/Guide-technique-filets-anti-insectes.pdf>.

Biocontrôle : utilisation de desséchants (dessiccation de la cuticule des insectes à corps mous). Liste des produits disponibles sous <https://ecophytopic.fr/protger/liste-des-produits-de-biocontrole>

6 Thrips

a. Observations

Les dégâts continuent sur les variétés précoces et demies tardives de chou à choucroute avec généralement 3 à 5 étages foliaires touchés.



Dégâts de thrips et thrips adulte (A. Claudel)

b. Analyse de risque

Avec les températures annoncées, leur prolifération va s'accélérer sur les choux qui ont une pomaison avancée, le sixième vol est en cours et le septième a démarré.

Niveau de risque : **moyen** à **élevé** sur chou avec une pomaison avancée.

c. Méthodes alternatives

Les pluies ou les irrigations régulières peuvent permettre de lessiver les individus et de contrôler la pression présente.

Biocontrôle : utilisation de desséchants (dessiccation de la cuticule des insectes à corps mou).
Liste des produits disponibles sous <https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole>

7 Pucerons

a. Observations

Pas d'observtiob cette semaine.

b. Seuil indicatif de risque

Pas de seuil de risque connu, les dégâts sont proportionnels à l'attaque et augmentent avec le temps.

c. Analyse de risque

Le développement des pucerons cendrés peut être rapide et exponentiel si les conditions leur sont favorables. Leur présence est facilement décelable grâce aux zones de décolorations blanches à violettes qu'ils engendrent sur les feuilles (généralement suivies de déformations).

Niveau de risque : **faible**.

d. Méthodes alternatives

Contrôle des adventices de la famille des crucifères et des déchets de cultures de choux précédentes sur lesquels les pucerons passent l'hiver.

Favoriser la présence d'auxiliaires (coccinelle, syrpe, chrysope etc, ...), qui peuvent suffire à contrôler les foyers installés par la mise en place de bandes fleuries.

Pose de filet anti-insectes, à installer sur cultures avant l'arrivée des premiers adultes. <http://www.planete-legumes.fr/wp-content/uploads/2016/12/Guide-technique-filets-anti-insectes.pdf>

Biocontrôle : utilisation de desséchants (dessiccation de la cuticule des insectes à corps mous).

Liste des produits disponibles sous <https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole>

8 Maladies fongiques et bactériennes

a. Observations

La situation reste globalement saine. Du mildiou sur les feuilles basses des choux engendrant une nécrose et un dessèchement de ses dernières est toujours observé sans évolution pour le moment. Les cas de Xanthomonas détectés restent minimes à l'échelle de la parcelle pour le moment. Les températures supérieures à 30°C vont ralentir la progression de la maladie. En revanche, les cas de rhizoctone et pourriture molle augmentent sur les variétés précoces de chou à choucroute qui arrivent à maturité (Almanac et Megaton). Sur chou-fleur récolté et chou pommé (fortement attaqué par les altises), des taches d'alternaria sont constatées.

b. Analyse de risque

Les dégâts engendrés par les ravageurs (altises, pucerons, chenilles phytophages et charançon) sont propices à l'installation des maladies fongiques et bactériennes. Une surveillance renforcée est donc nécessaire en particulier sur les choux dont la pommaison est supérieure à 50 % de la taille finale.

Niveau de risque : moyen.



Pourriture molle (A. Claudel)



Xanthomonas (A. Claudel)



1 Description du réseau

Le réseau est constitué de 2 parcelles dans les différents secteurs de production :
Muttersholtz : Marabel, sénescence, 20 mm, sol humide, nécroses
Kappelen : Laura, 35 mm, début sénescence, fusariose et rhizoctone sur quelques pieds

Les cultures restantes sont stressées suite à la canicule, toujours favorables aux ravageurs (taupins signalés). Les demi-tardives sont en sénescence. La majorité des parcelles sont défanées. Les pluies et la baisse des températures permettent de melleurs conditions de récolte.

2 Mildiou

a. Observations

Attention à la confusion avec les brûlures dues au soleil (effet loupe) ou la sénescence.

b. Seuil indicatif de risque

Pas de seuil de nuisibilité, la protection est préventive. Les dégâts sont proportionnels au nombre de plantes atteintes et à la précocité de l'attaque, qui peut être fulgurante. Les tubercules formés peuvent également être atteints et pourrir.

Le modèle Mileos® d'Arvalis Institut du Végétal permet la modélisation du risque de la maladie selon la sensibilité variétale du feuillage en fonction des contaminations et des sporulations. suivant). Il faut que la parcelle ait atteint les 30 % de plants levés pour prendre en compte le risque mildiou.



Tache de mildiou (D. JUNG)

c. Analyse de risque

Les contaminations et l'évolution de la maladie dépendent des températures et de l'humidité. Ainsi, les conditions climatiques idéales pour le développement du mildiou sont d'abord une succession de périodes humides et assez chaudes (un optimal de 18-22°C) pour la formation des spores. La germination des spores est ensuite possible dès que la durée d'humectation du feuillage est égale à 4 heures et plus, assortie de températures comprises entre 3-30°C (optimal 8-14°C). Par la suite, les pluies, les hygrométries supérieures à 90% associées à des températures comprises entre 10-25°C favorisent l'évolution de la maladie. En revanche, des températures négatives (-2°C) ou bien à l'inverse celles supérieures à 30°C limitent ou bloquent le développement du champignon.

Niveau de risque : nul à faible en hausse suite aux épisodes orageux. L'humidité nocturne suite aux pluies passées augmente avec également des brumes matinales locales. Les températures élevées ont limité la survie des spores. Le risque peut être plus élevé quand la culture couvre le sol, dans les zones abritées, humides (rivières, étangs), bâchées ou irriguées. Les cycles de développement vont de 5 à 15 jours. Plus de données depuis début août à Geispitzen.

Le tableau suivant présente les seuils de risque par type de sensibilité variétale. Le poids de contamination correspond au nombre de spores présentes dans l'environnement et à leur capacité à germer.

Niveau de risque de contamination	Insuffisant	Faible	Moyen	Élevé	Très élevé
Attaque possible sur	Non	Repousse ou plant contaminé/déchet	Variété Sensible	Variété Intermédiaire	Variété Résistante
Poids de contamination	Nul	Inférieure à 2	Supérieure à 2	Supérieure à 3	Supérieure à 4

Le tableau suivant donne la situation du modèle Mileos pour 4 stations météo, valable dans un rayon de 7 à 10 km selon la topographie, sur les 7 derniers jours pour l'atteinte du seuil variétal.

Stations météo	Le seuil de nuisibilité est atteint si le poids de contamination >2								Précipitations cumulées sur la période (mm)
	12 août	13 août	14 août	15 août	16 août	17 août	18 août	19 août	
Duttlenheim	0	0,54	0,54	1,04	0,87	0,9	1,04	1,04	27,9
Muttersholtz	0,73	0,77	0	0,62	0,61	0,75	0	1,02	8,9
Valf	0	0,54	1,04	1,04	0,61	1,04	1,04	1,15	19,9
Geispitzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Le seuil de nuisibilité (nombre de spores qui contaminent supérieur au seuil de sensibilité variétale) n'a pas été atteint. Le poids de contamination (nombre de spores qui contaminent) est faible depuis une semaine mais en hausse. Il le reste pour les 2 jours à venir. La réserve de spores était et sera insuffisante pour une contamination partout dans les 48 heures avec un index moyen. Ailleurs, le risque peut être plus élevé, surtout en situation irriguée. Le potentiel de sporulation est faible à moyen (à Muttersholtz) pour les 48 h à venir.

d. Méthodes alternatives

Élimination des tas de déchets de triage et des repousses de pommes de terre.

Utilisation de plants sains.

Planter des variétés moins sensibles.

Éviter les longues périodes d'humidité (irrigation en cours de journée, drainage, aération).

Pratiquer une rotation supérieure à 3 ans.

Biocontrôle : des produits peuvent être appliqués avant des périodes humides protège de façon préventive des contaminations.

3 Alternaria

a. Observations

De l'alternaria s'observe sur les variétés en fin de cycle. La sensibilité est précoce cette année en raison des plantations précoces et de l'avancement du feuillage surtout en situation non irriguée.



b. Seuil indicatif de risque

Pas de seuil de nuisibilité, la protection est préventive. Les dégâts sont proportionnels au nombre de plantes atteintes et à la précocité de l'attaque, qui peut être rapide. Les tubercules formés peuvent également être atteints et occasionner des pertes de rendement (-15-20 % en Alsace).


c. Analyse de risque

Pour que l'alternariose se développe, il faut des températures comprises entre 13 et 30°C avec un optimum entre 20 et 22°C. Pour qu'il y ait production de spores, il faut une alternance entre périodes alliant sécheresse et lumière et des périodes alliant obscurité et humectation (rosée). L'alternariose se développe préférentiellement sur les feuilles « âgées » (feuilles du bas), abimées (vent, grêle) et sur les plantes stressées ou carencées. Les années sèches sont également favorables à la maladie. Il y a peu de formation de nouvelles feuilles car la minéralisation est moins bonne.

Dans les parcelles de variétés sensibles à l'alternariose conduites en sec et qui souffrent de stress (stress hydrique, rotations courtes, carence minérale...), on peut voir des symptômes d'*Alternaria alternata*. L'*Alternaria alternata* est un parasite de faiblesse moins virulent que l'*alternaria solani* (il faut 10 à 100 fois moins de spores de *solani* pour générer une infection que de spores d'*alternata*). L'*Alternaria alternata* émet moins de toxine que le *solani*, il a un impact moins important sur le rendement.


Niveau de risque : faible à moyen en variété sensible. L'index de risque 2020 a été réactualisé sur le site du CHU de Strasbourg à la date du 14 août pour la semaine 32. Le niveau de spores capturées est faible à moyen et proche ou inférieur à la moyenne des années précédentes depuis début juillet. Les températures sont favorables et le seuil de sensibilité (la floraison) est dépassé pour toutes les parcelles.

STRASBOURG



Voici des listes non exhaustives de sensibilités variétales à l'alternaria, il faut ajouter Agata en (très) sensible.

AGRIA	BINTJE	FONTANE	LADY CLAIRE	SAMBA
ALPHA	CHALLENGER	GLORIA	MANITOU	SANTANA
AMANDINE	CHARLOTTE	INNOVATOR	MARABEL	SATURNA
AMYLA	DAISY	JUNIOR	MARKIES	...
AZIZA	DESIBELLE	KARDAL	ORLA	
BELANA	DÉSIRÉE	KRONE	RAMOS	





1 Stade de la culture/description du réseau

Pas d'observations cette semaine. Peu de changements sont observés depuis les semaines précédentes : la situation sanitaire est globalement saine. Cependant, la canicule s'est faite ressentir sur certains sites : des symptômes de coup de chaud ou des salades montées ont pu être observées. Les pluies ont augmenté le risque de maladies.

2 Pucerons

a. Observations

Aucun foyer de puceron n'a été relevé sur laitue de plein champ sur les sites observés semaine dernière.

b. Seuil indicatif de risque

Le seuil indicatif de risque est de 10 % des plantes avec au moins un puceron de mi-mai à fin juillet.

c. Analyse de risque

Le risque dépend du mode de commercialisation (il y a en général plus de tolérance pour de la vente en direct). Il est **faible** en plein champ cette semaine, mais reste variable selon le site considéré et le niveau de développement des auxiliaires.

d. Méthodes alternatives

Une forte fertilisation azotée augmente la sensibilité des plantes aux pucerons.

Les auxiliaires présents naturellement dans la parcelle peuvent maîtriser efficacement la population de pucerons, à condition qu'ils soient suffisamment développés au moment où survient le risque.

3 Botrytis

a. Observations

Des cas ont été signalés semaine dernière. Le temps pluvieux depuis une semaine a favorisé son développement.

b. Analyse de risque

Le risque est **moyen** en plein champ cette semaine.

c. Méthodes alternatives

Les infections par le botrytis sont favorisées par une forte fertilisation azotée ainsi que par les blessures (y compris des pucerons) qui sont des points d'entrée de la maladie. L'espacement des têtes (10/m² au lieu de 12 ou 14) permet d'améliorer la ventilation de la culture et de diminuer la pression. La plantation sur plastique isole les feuilles du sol ce qui limite aussi l'infection.



Botrytis sur batavia. La sporulation grise est bien visible (H. BEYER)



1 Stade de la culture/description du réseau

Pas d'observations cette semaine. La plupart des variétés étaient à un stade de sénescence avancée ou ont été récoltées pour les variétés les plus précoces (AMANDINE, ADORA).

2 Mildiou

a. Observations

Aucun symptôme déclaré de mildiou n'a été observé.

b. Seuil indicatif de risque

Pas de seuil de nuisibilité, la protection est préventive. Les dégâts sont proportionnels au nombre de plantes atteintes et à la précocité de l'attaque, qui peut être fulgurante. Les tubercules formés peuvent également être atteints et pourrir. Le modèle Mileos® d'Arvalis Institut du Végétal permet la modélisation du risque de la maladie selon la sensibilité variétale du feuillage en fonction des contaminations et des sporulations (voir tableau suivant). Il faut que la parcelle ait atteint les 30 % de plants levés pour prendre en compte le risque mildiou.



Allians en sénescence (L.HUSSON)

c. Analyse de risque

Les contaminations et l'évolution de la maladie dépendent des températures et de l'humidité. Ainsi, les conditions climatiques idéales pour le développement du mildiou sont d'abord une succession de périodes humides et assez chaudes (un optimal de 18-22°C) pour la formation des spores. La germination des spores est ensuite possible dès que la durée d'humectation du feuillage est égale à 4 heures et plus, assortie de températures comprises entre 3-30°C (optimal 8-14°C). Par la suite, les pluies, les hygrométries supérieures à 90% associées à des températures comprises entre 10-25°C favorisent l'évolution de la maladie. En revanche, des températures négatives (-2°C) ou bien à l'inverse celles supérieures à 30°C limitent ou bloquent le développement du champignon.

Niveau de risque :

Le tableau suivant présente les seuils de risque par type de sensibilité variétale. Le poids de contamination correspond au nombre de spores présentes dans l'environnement et à leur capacité à germer.

Niveau de risque de contamination	Insuffisant	Faible	Moyen	Élevé	Très élevé
Attaque possible sur	Non	Plant contaminé/déchet	Variété Sensible	Variété Intermédiaire	Variété Résistante
Poids de contamination	Nul	Inférieure à 2	Supérieure à 2	Supérieure à 3	Supérieure à 4

Evaluation du risque d'après MILEOS® Le tableau suivant indique la situation du modèle MILEOS® pour 2 stations météo, valable dans un rayon de 7 à 10 km selon la topographie, sur les 7 derniers jours.

Stations météo	Le seuil de nuisibilité est atteint si le poids de contamination >2								Précipitations cumulées sur la période (mm)
	28 juillet	29 juillet	30 juillet	31 juillet	1 ^{er} août	2 août	3 août	4 août	
Lucey	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
Crantenoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Niveau de risque : faible sur les stations considérées (cf. tableau). Le risque mildiou est nul depuis le 17 juillet sur les deux stations suivies. Les conditions caniculaires prévues pour les prochains jours ne favoriseront pas les contaminations.

d. Méthodes alternatives

Élimination des tas de déchets de triage et des repousses de pommes de terre. Utilisation de plants sains.

Planter des variétés moins sensibles.

Éviter les longues périodes d'humidité (irrigation en cours de journée, drainage, aération).

Pratiquer une rotation supérieure à 3 ans.

Biocontrôle : des produits appliqués avant des périodes humides protègent de façon préventive des contaminations.



Il ne faut pas confondre le mildiou avec d'autres maladies

3 Doryphores


a. Observations

Quelques adultes et quelques larves ont été observées dans les parcelles semaine dernière, mais la pression reste faible. Cependant, le risque est variable selon le site et les larves de la seconde génération peuvent toujours être présentes, il faut donc rester vigilant.

b. Seuil indicatif de risque

En conventionnel : 2 foyers sur 1 000 m² (un foyer = 1 à 2 plantes avec env. 20 larves de la taille d'un grain de blé).

En bio : 30 % des plantes avec les larves. Surveiller les bordures pour détecter de façon précoce.



De gauche à droite : larve L1, L2 et L3 de doryphore. Source : www.insectes-net.fr

c. Analyse de risque

Le risque est **moyen** en présence de larves défoliatrices. Le risque augmente avec la taille des larves.

d. Méthodes alternatives

Rotations culturales longues.

Éliminer les adultes et les repousses qui assurent la multiplication.

Attention aux dernières générations qui forment l'inoculum de l'année suivante.

Biocontrôle : des produits agissent sur larves par ingestion. Étant photosensibles et lessivables, il est important de l'appliquer lors de journées couvertes ou en soirée et en dehors des pluies.



1 Stade de la culture/description du réseau

Pas d'observations cette semaine. Les premières séries de tomates avaient pour les plus avancées leur 8^{ème} bouquet formé et sont en production plus d'un mois environ. Les secondes séries sont entrées en production semaine dernière. La situation sanitaire est globalement saine. Pour les cucurbitacées, l'alternance de nuits fraîches et de journées chaudes a favorisé le développement d'oïdium sur les courgettes de plein champ. Les pucerons, de moins en moins présents ces dernières semaines, étaient observés avec une pression moyenne sur un site sur concombre et aubergine, avec toujours beaucoup de larves de coccinelles sur les foyers. Les températures élevées de la semaine dernière ont favorisé le développement des acariens qui étaient présents sur les trois sites observés la semaine passée avec des pressions variables, sur aubergine et concombre. Des symptômes physiologiques (coups de soleils sur fruits, enroulement foliaire) étaient également visibles du fait de la canicule.



Coup de soleil sur tomate (H.BEYER)

2 Pucerons

a. Observations

Des pucerons étaient observés sur un site sur concombre et aubergine, avec une pression moyenne. Les auxiliaires restent cependant bien présents. Sur les autres sites vus cette semaine, les fortes pressions en puceron observées plus tôt dans la saison sont désormais totalement maîtrisées. Il faut cependant rester vigilant, car la situation peut varier fortement d'un site à l'autre et dépend du développement des auxiliaires.



Colonie en développement de pucerons verts sur aubergine (H. BEYER)

Le risque reste globalement **moyen**, mais il est variable d'i de développement des auxiliaires.

c. Méthodes alternatives



Larve de coccinelle et pucerons parasités (momies beige-doré) sur feuille d'aubergine (L.HUSSON)

Evitez la surfertilisation qui favorise les pucerons. Restez vigilants sur les aubergines et poivrons qui sont les cultures les plus sensibles.

Certaines préparations ont la capacité de dessécher la peau molle des pucerons sans nuire aux auxiliaires.

L'installation de bandes fleuries ou de plantes riches en nectar favorise la présence des auxiliaires au voisinage des abris, mais surtout à partir de juin.

3 Acariens

a. Observations

Les acariens étaient présents sur les trois sites observés semaine dernière, avec des pressions variables selon le mode d'irrigation (les aspersion limitent leur développement). Ils sont présents sur aubergine sur tous les sites et sur concombre sur deux d'entre eux. Les températures très élevées et le temps sec prévu pour les prochains jours vont être à nouveau favorables à leur développement.

b. Analyse de risque

Le risque est **moyen à élevé** sur concombre et aubergine selon le degré de présence des acariens.

c. Méthodes alternatives

Les acariens apprécient la chaleur et la sécheresse. Toute méthode qui permet d'atténuer ces facteurs diminue la pression : ombrage, bassinage des foyers, etc. Les lâchers d'auxiliaires peuvent être inefficaces si le climat n'est pas contrôlé.

Biocontrôle : en cas de foyer déclaré, des auxiliaires « nettoyeurs » (chrysopes à 5/m²) peuvent être utilisés pour compléter les populations d'auxiliaires naturellement présents.



1 Stade de la culture/description du réseau

Pas d'observations cette semaine. Les chenilles phytophages restent encore peu présentes semaine dernière : seules quelques pontes de piérides étaient relevées sur un site. Des aleurodes étaient également observées, mais sans que cela ne nuise aux cultures. Les fortes chaleurs lors de la canicule ont cependant favorisé le retour des altises, qui étaient présentes sur tous les sites observés avec une forte pression, sur les choux et les rutabagas.



Dégâts d'altises sur semis (H. BEYER)

2 Altises

a. Observations

Les altises étaient présentes avec une pression élevée sur tous les sites observés semaine dernière. Les températures élevées prévues pour les prochains jours vont leur être favorable, il faut donc être très vigilant, surtout sur les jeunes semis.

b. Analyse de risque

Le risque dépend du stade de la culture : il est **élevé** cette semaine sur les jeunes plantations et les jeunes semis, et **moyen** sur des cultures déjà plus développées.

c. Méthodes alternatives

L'utilisation de filets anti-insectes adaptés montre de bons résultats (voir guide [filets](#)).

3 Chenilles

a. Observations

Quelques pontes de piérides de la rave ont été observées sur des choux sur un site la semaine passée. Sur les autres sites, ni pontes ni chenilles n'avaient été relevées. Le risque était donc faible, mais il faut rester vigilant : chenilles et papillons ont été observés sur d'autres sites les semaines précédentes.

b. Analyse de risque

Le risque est **faible** à **moyen** cette semaine.

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est et de la DRAAF :

<http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/>
<http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes>

Affinez vos connaissances sur les principales adventices des Grandes Cultures et les méthodes de lutte préventive en consultant le site INFLOWEB : <http://www.infloweb.fr>



Édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture GRAND EST, sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau Légumes :

Arvalis Institut du Végétal, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Gustave Muller, Lycée agricole du Pflixbourg, PLANETE Légumes.

Rédaction : PLANETE Légumes.

Relecture assurée par la DRAAF (SRAL).

Crédits photos : VisualHunt, PLANETE Légumes.

Coordination et renseignements :

Claire COLLOT, Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Tél. : 03 83 96 85 02. Courriel : claire.collot@grandest.chambagri.fr

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande sur le site internet de la Chambre d'Agriculture du Grand Est

<http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/abonnez-vous-gratuitement-a-nos-bsv/>

Action pilotée par le ministère chargé de l'Agriculture, avec l'appui financier de l'Agence Française de Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du Plan ÉCOPHYTO II.