



LA MOSAÏQUE DU FIGUIER



Organismes
Non
Réglementés

La mosaïque du figuier est une maladie causée par *Fig Mosaic virus*. Il s'agit d'un organisme réglementé non de quarantaine, c'est-à-dire qu'aucun figuier (*Ficus carica*) présentant des symptômes de cette maladie **ne peut être commercialisé ou déplacé**.

○ Description



La maladie apparaît dès le printemps, elle provoque des **décolorations** jaunes sur les feuilles et des taches **en forme de damiers**. On observe également de petites boursouflures sur les feuilles atteintes. Les symptômes peuvent survenir dès l'apparition des premières feuilles. Elle peut ne toucher qu'une partie des branches ou bien l'ensemble de la plante.



Début d'attaque sur
feuille et chlorose foliaire
Photos : FREDON CVL

Les **fruits** sont également touchés mais les symptômes sont moins prononcés.

Le virus est transmis de plante en plante par la pique de l'acarien *Aceria ficus* ou par la taille avec des outils non désinfectés. Mais ce sont les boutures/greffes et la vente de matériel virosé qui expliquent son importante dissémination à travers tout le pays.

On observe chez les plantes affectées une plus faible production de fruits ainsi que la chute prématurée des figes. En général, le virus **n'entraîne pas la mort de l'arbre**.



Attaque sur fruit et mosaïque sur feuille

Photos : SRAL Pays de la Loire et FREDON CVL

○ Mesures prophylactiques



Une plante présentant des symptômes ne peut être soignée. Seules des **mesures de prévention** peuvent être efficaces :

- Ne pas acheter de plantes qui présentent des signes de mosaïque du figuier.
- Ne pas faire de bouture de figuiers avec symptômes.
- Désinfecter correctement les outils de taille entre deux sujets.
- Contrôler les acariens en cas de présence (des huiles végétales de biocontrôle existent).



Tâches chlorotiques sur feuilles et éclaircissement des nervures

Photos : FREDON CVL

○ Confusions possibles



- **Jaunissement des feuilles** : Cela peut être dû à un manque ou un excès d'eau. Les figuiers préfèrent les sols bien drainés et être exposé au soleil.
- **Pourriture racinaire** : Cette maladie est causée par un champignon qui s'attaque aux racines de l'arbre. Au premier stade, les feuilles commencent par jaunir, ce qui peut faire penser à la mosaïque.

En cas de suspicion de présence de *mosaïque du figuier*, il convient de prévenir les autorités compétentes : DRAAF Centre Val de Loire et FREDON Centre Val de Loire.

Source article :

https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_mosaïque_figuier.pdf

Polleniz : "Virus de la mosaïque du figuier - organisme réglementé non de quarantaine (ORNO)"

https://draaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/lettre_actualites_phyto_ile-de-france_no152- aout_2022.pdf