

Bulletin de Santé du Végétal des Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures (JEVI)

LA SANTE DES JARDINS ET ESPACES VERTS

N°7 – 3 septembre 2026

A RETENIR :

ACTUALITES ...

- Perception des enjeux de la santé environnementale en région Centre Val de Loire

ZOOM SUR ...

- Après les épisodes de canicules et de sécheresse, comment aider les plantes du jardin à repartir ?

A SURVEILLER ...

- Punaises ! Elles sont partout ...
- Dégâts d'oiseaux et forte pression en carpocapses sur les fruits
- Pyrale du buis : présence de chenilles sur quelques sites ... Surveiller
- Présence en augmentation de cochenilles

DOSSIER DU JOUR ...

- La maladie des mille chancres du noyer

VIGILANCE SUR ...

- Le Datura stramoine et le Scarabée japonais

Prochain et dernier bulletin : jeudi 24
septembre

REJOIGNEZ LE RESEAU D'OBSERVATEURS BSV JEVI

Le contenu des Bulletins de santé du végétal (BSV) est basé sur les informations biologiques et épidémiologiques issues d'un réseau d'observateurs formés et accompagnés par un animateur régional, rédacteur du BSV. Plus les observateurs sont nombreux et bien répartis sur le territoire, plus le BSV donne une image précise et fiable de la santé des végétaux dans les différents espaces végétalisés (parcs et jardins publics, jardins historiques, terrains de sport, infrastructures, serres de collection, jardins privés, etc.).

Rejoignez le réseau de votre région et participez à l'enrichissement des BSV tout en renforçant vos connaissances en santé et protection des végétaux !

Pour plus d'information, contactez nous !

Financé par



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

Retrouvez gratuitement les
BSV sur le site
de la [DRAAF CVL](#)



FREDON
CENTRE-VAL DE LOIRE

Retrouvez gratuitement le
BSV JEVI sur le site de
[FREDON Centre Val de
Loire](#)



RÉSEAU NATIONAL DE
SURVEILLANCE JEVI

Identifiez les cibles de produits de biocontrôles grâce à ce logo



Identifiez les résistances de bioagresseurs à des produits phytopharmaceutiques (PPP)



SOMMAIRE

ACTUALITES	3
Perception des enjeux de la santé environnementale en région Centre Val de Loire	3
Restrictions d'usage de l'eau encore d'actualité	3
ZOOM SUR	4
Après la sécheresse et la canicule, comment aider les plantes du jardin à repartir ?	4
JARDINS ET HABITATS.....	6
Punaises des champs	6
POTAGERS.....	7
Betterave potagère.....	7
Haricot vert	7
Poireau	7
Tomate.....	7
Aubergine - concombre – tomate - haricot.....	8
Courgette-cornichon – concombre - courges.....	8
Courgette	8
VERGERS	9
Tous fruitiers.....	9
Fruitiers à pépins	9
Noyer.....	10
Vigne.....	11
ARBRES, ARBUSTES ET PLANTES d'ORNEMENT	12
Buis.....	12
Rosier	13
Hortensia.....	13
Hortensia - Agrumes.....	13
DOSSIER TECHNIQUE La maladie des 1000 chancres	15
VIGILANCE SUR	16
Le Datura stramoine	16
Le Scarabée japonais – <i>Popillia japonica</i>	16
L'Ambrosie – <i>Un enjeu de santé publique</i>	17
AUXILIAIRES	18



Inscription gratuite au bulletin

Si vous souhaitez recevoir directement dans votre messagerie, dès sa parution, le bulletin régional « La Santé des Jardins et Espaces Végétalisés », vous pouvez vous inscrire sur notre site internet FREDON Centre Val de Loire. L'inscription est gratuite et nous ne transmettons que les bulletins.

Ci-joint le lien pour vous inscrire : [inscription au bulletin](#)

Perception des enjeux de la santé environnementale en région Centre Val de Loire

Aidez-nous à faire progresser les actions conduites en région pour mieux faire connaître et sensibiliser chacun d'entre nous aux enjeux de la Santé Environnementale sur la Santé Humaine.

Dans le cadre de la mise en œuvre du [4^e Plan régional santé environnement \(PRSE 4\) Centre-Val de Loire](#), l'ARS Centre-Val de Loire a confié à l'Observatoire régional de la santé (ORS) Centre-Val de Loire la réalisation d'une **enquête** consacrée à la **perception des enjeux de santé environnementale** par les habitants de la région.

Qualité de l'air et de l'eau, alimentation, bruit, habitat, changement climatique ou encore exposition aux substances chimiques : chacun est invité à s'exprimer sur les sujets qui le préoccupent.

Le questionnaire est ouvert jusqu'au 30 octobre 2026 à toute personne âgée de 18 ans ou plus résidant en Centre-Val de Loire. Il est accessible en ligne :

- sur le site de l'ARS Centre-Val de Loire [Enquête santé environnement : donnez votre avis pour mieux orienter les actions en Centre-Val de Loire | Agence régionale de santé Centre-Val de Loire](#)
- sur le site de l'ORS : [Enquête santé environnement en Centre-Val de Loire](#).

Chaque participation contribuera à mieux adapter les actions du PRSE 4 aux attentes, aux besoins et aux réalités des habitants et des territoires de la région.

Restrictions d'usage de l'eau encore d'actualité

Les mesures de restriction de l'usage de l'eau sont encore en cours dans de nombreux secteurs.

Vous pouvez suivre facilement l'évolution de ces restrictions pour votre commune en consultant la plateforme mise en place par Météo France : <https://vigieau.gouv.fr/> . Ce site vous informera sur les restrictions d'eau tout au long de la période de sécheresse.

ZOOM SUR ...

Après la sécheresse et la canicule, comment aider les plantes du jardin à repartir ?

Comme nous, les plantes ont eu très chaud cet été. Elles ont subi une sécheresse très sévère, des périodes de canicule à répétition et surtout des rayonnements solaires intenses et longs.

Les plantes en ressortent **très fragilisées**. Elles peuvent présenter des échaudures sur leur tronc, des brûlures du feuillage et des fruits. Leur croissance et leur développement se voient dégradés. Les végétaux sont pour certains plus vulnérables face aux maladies et parasites. De plus, l'activité dans le sol est également dégradée voire stoppée. La décomposition des matières organiques et la minéralisation sont ralenties. Les vers de terre se sont enfoncés dans le sol et se sont mis en diapause.



Photo J. Chabaut

Il est donc important d'intervenir convenablement et au bon moment pour les aider à reprendre de la vigueur.

Comment les aider ?

Arbres, arbustes d'ornement et fruitiers

Surtout, **NE PAS SE PRECIPITER POUR TAILLER** les végétaux ligneux défoliés juste après ces épisodes de sécheresse et de canicule. En effet, certains végétaux sont en train de refaire de nouvelles pousses / feuilles ; **une taille même légère ne ferait qu'accentuer le stress hydrique de la plante**. Attendre les premières baisses durables de températures et le retour de bonnes pluies.

Pour les sujets ayant perdu toutes les feuilles : c'est bon signe.

Pour les sujets ayant gardé les feuilles séchées sur les branches et rameaux : A surveiller et attendre pour vérifier s'ils reprennent et redémarrent leurs bourgeons au printemps suivant.

Pour les résineux : le brunissement est mauvais signe. Attendre et surveiller la reprise au printemps suivant.

- 1- Faire un premier diagnostic : **est-ce bien mort** ? En effet, une chute précoce du feuillage ou des feuilles complètement grillées ne signifient pas que le végétal soit mort. Il faut donc vérifier l'état du bois sous l'écorce des branches ou au niveau des bourgeons (si encore vert, il y a encore de la vie !).

ZOOM SUR ... SUITE

- 2- Eviter les tailles sévères. Supprimer uniquement les parties mortes.
- 3- Restaurer progressivement l'humidité dans le sol. Griffer légèrement la terre pour briser la croûte, apporter du paillage et de la matière organique, arroser si nécessaire et si autorisé par les arrêtés de restriction de l'usage de l'eau : <https://vigieau.gouv.fr/>.
- 4- Surveiller l'état du végétal au printemps suivant.

Gazon

Voir aux prochaines pluies où il redémarre :

- Là où il repart, laisser pousser pour faire une coupe haute avant l'hiver
- Sinon, semer du gazon spécial terrain sec. Et bien sûr attendre l'automne pour ce semis

Au potager

- Pour les légumes qui ont trop souffert durant l'été, c'est trop tard. Arracher et reconstituer le sol : compost et paillage, avant de replanter des légumes de saison
- Pour les autres, poursuivre l'arrosage (si possible) et pailler les légumes d'été et d'automne pour qu'ils arrivent à maturité
- Retirer les fruits malades et les plantes montées à graine
- Attendre la pluie et semer des engrais verts à l'automne dans les zones où il n'y aura pas de nouvelles plantations d'automne.

- Après les prochaines pluies, biner pailler et planter les légumes d'automne. N'hésitez pas à compléter par un arrosage du sol (suivant restrictions) pour qu'il soit bien ressuyé !



Punaises des champs

On les appelle aussi Punaises des céréales ou punaises du colza

Nous constatons en ce mois d'août une pullulation d'importance exceptionnelle de la punaise des champs (punaise du genre **Nysius** dont la plus courante est *Nysius cymoides*).

De nombreux signalements nous sont fait dans les départements du Loiret, du Loir et Cher, du Cher et d'Indre et Loire. Des agrégations de nombreux insectes (adultes et larves) sont signalés dans les propriétés à proximité de champs récoltés (montants de fenêtre et porte, murets ...).

Ces punaises **ne constituent pas un danger** pour la santé humaine ni pour la santé des plantes de vos jardins.

Les agrégations sont provisoires et vont disparaître naturellement au bout de quelques jours ... alors patience !

Symptômes et éléments de reconnaissance...



Photo GDA Loir Beauce
*Agrégations de punaises deu genre
Nysius sur un rebord de muret*



Photos Chapelin-Viscardi et al. 2017
Nysius cymoides
3- Larve 4- adulte

Méthodes de régulation

- La seule méthode possible de réduction des pullulations (arrosage et nettoyage à l'eau autour des habitations) n'est pas utilisable cette année en raison de la sécheresse et de la pénurie d'eau.



POTAGERS

Betterave potagère

Maladies et ravageurs

Quelques taches de cercosporiose sur feuilles sont observées sur plusieurs sites de la région. Si la maladie arrive en fin de cycle, elle n'impactera pas les racines.

Les calibres des racines sont réduits suite à la météo de cette année. Pour les semis les plus tardifs pas encore arrivés en récolte, les racines peuvent bénéficier du radoucissement pour grossir avant leur récolte.

Haricot vert

Maladies et ravageurs

Les haricots ont été particulièrement difficiles à réussir avec la canicule. De nombreux semis ont échoué, des levées très irrégulières, une production très limitée malgré plusieurs essais de semis réalisés dans la saison.

On peut observer dans quelques cas :

- de l'anthracnose sur gousses
- des chenilles de noctuelles grignotant les gousses
- de fortes attaques d'acariens tisserands



Photo FREDON CVL :
Anthracnose sur
gousse de haricot

Poireau

Maladies et ravageurs

Culture saine mais ralentie, qui reprend un développement plus normal avec le rafraîchissement.

Quelques thrips peuvent toujours être observés mais sans dégât sur la végétation.

Tomate

Maladies et ravageurs

Pour les thrips et acariens, les problèmes sont en grande partie derrière nous avec le rafraîchissement des températures. On peut voir la végétation redémarrer. Les tomates cerise ont souvent été moins impactées que les grands fruits. Cette année, les peaux sont plus épaisses. En grands fruits, en fonction des variétés, parfois présence de nombreux fruits avec du cul noir.

Financé par

Aubergine - concombre – tomate - haricot

Punaises

Des dégâts de punaises sont encore signalés avec présence de larves et d'adultes sur plusieurs sites de la région. Ce sont surtout des punaises vertes (*Nezara viridula*) et des punaises diaboliques (*Halyomorpha halys*). L'arrêt des grandes chaleurs ne fait pas fuir les punaises. Elles sont là, elles y restent et continuent de s'alimenter sur les fruits.

Leurs dégâts (piqûres) sont visibles sur les fruits et les tiges des différents légumes.

A surveiller !

Méthodes de lutte et biocontrôle

- La méthode manuelle est la plus efficace : récupérez les adultes et les larves et écrasez-les.
- Le voile est aussi possible mais il ne doit pas toucher les plantes. Il doit être mis en place avant l'arrivée des punaises.

Courgette-cornichon – concombre - courges

Oïdium

Les écarts de températures jour/nuit sont maintenant plus importants ce qui explique les départs d'oïdium sur feuilles. Le stress des plantes favorise également l'oïdium. Les grandes chaleurs et le manque d'eau sont des sources de stress. Il y a un intérêt à faire un semis plus tardif pour la 2^e partie de la saison.

La baisse actuelle des températures diurnes est moins favorable, limitant la progression de la maladie sur les nouvelles feuilles.

Méthodes de lutte et biocontrôle

- L'aération des plantes permet de limiter la présence d'humidité
- L'irrigation au goutte à goutte ou par tuyaux poreux et le paillage peuvent contribuer à diminuer le développement de la maladie.



Photo FREDON CVL : Oïdium sur courgette

Courgette

Problèmes physiologiques

Avec les fortes températures et le manque d'eau, on a pu observer un phénomène particulier. Seules les fleurs mâles, sont apparues. Les fleurs femelles demandant plus d'énergie ne se sont pas formées.

La baisse des températures actuelle permet à ses plantes de former enfin des fleurs femelles si les pieds ne sont pas trop vieux.



Tous fruitiers

Dégâts d'oiseaux, de frelons et chutes précoces des fruits

En plus des coups de soleil qui ont abîmé les fruits trop exposés aux rayonnements, on peut observer des chutes précoces de fruits (avant maturité) : en cause, encore l'excès de chaleur et le manque d'eau estival.

De plus, de nombreux dégâts d'oiseaux sur fruits sont signalés. Tous les fruits sont concernés : pêches, prunes, pommes et poires, petits fruits et grappes de vigne.

Les frelons et guêpes se délectent également de nos fruits et vont profiter des plaies existantes (oiseaux, chenilles foreuses) pour atteindre la pulpe du fruit. **Attention au risque de piqûres en ramassant ou en cueillant les fruits !**



Photo : J. Chabault
Poire picorée par des oiseaux

Que faire

- Si possible, poser des filets de protection
- Accrocher des bandes réfléchissantes dans les branches, qui scintillent avec le vent.
- Placer des silhouettes de rapaces visibles autour du verger pour dissuader les intrus.
- Installer des moulins à vent qui font un peu de bruit en tournant.

Laissez toutefois des zones accessibles aux oiseaux, éloignées de vos fruitiers, afin de continuer à les accueillir dans vos jardins sans risque pour vos fruits. Continuez à leur aménager des espaces buvettes et bains.

Fruitiers à pépins

Le carpocapse du pommier

Cette année encore, les piqûres et dégâts sur jeunes fruits sont très nombreux.

Les conditions climatiques ont favorisé une troisième génération de papillons. La pression carpocapse est très forte cette année.



Photos : FREDON CVL. A gauche, papillon de carpocapse. Au centre et à droite, dégât sur fruit avec présence de « vermoulure » et galerie se dirigeant vers les pépins

Quelques informations complémentaires avec en plus un tuto vidéo sur <https://www.jardiner-autrement.fr/lutter-contre-le-carpocapse-a-laide-du-biocontrôle>

Méthodes de lutte et biocontrôle

- Mise en place des bandes cartonnées autour des troncs (30 cm du sol) afin de piéger les larves hivernantes. Pensez à retirer ces bandes en fin d'automne.
- **Utiliser des produits de biocontrôle** pour lutter contre les jeunes chenilles.
- **Favoriser la présence des prédateurs naturels, oiseaux, forficules (perce-oreilles) et chauves-souris** qui consommeront, par la suite, les larves de carpocapses. D'après une étude du CTIFL, les chauves-souris sont friandes des papillons de carpocapses.
- **La pose de filet spécifique** sur des arbres de faible taille peut s'avérer très efficace.

Noyer

Mouche du brou de la noix (*Rhagoletis completa*)

La mouche du brou du noyer est un ravageur particulièrement néfaste pour la production et la conservation des noix. L'adulte vole de début juillet à septembre. Les femelles déposent leurs œufs sous la surface du brou durant cette période.

Le vol se termine.



Photo FREDON Nouvelle Aquitaine
Mouche du brou de la noix (*Rhagoletis completa*)



Photo J. Chabault
Brou noirci et larves de mouche du brou de la noix



Les signes d'infestation peuvent être confondus avec ceux de la bactériose. Cette maladie s'attaque en premier lieu **au feuillage qui présente des taches jaunâtres diffuses dans un premier temps**. Elle provoque également des taches noires sur le brou.

Méthodes de lutte et biocontrôle

- ☒ En **fin de développement**, les larves sortent du brou, **se laissent tomber au sol pour finir leur cycle**. Le ramassage des brous et leur éloignement par rapport aux noyers permettent de limiter les populations de mouches l'année suivante.

Vigne

La Flavescence dorée

La **Flavescence dorée** est une **maladie de quarantaine** (Directive Européenne 2000/29/CE) particulièrement contagieuse chez la vigne. Présente dans la plupart des zones de production viticole du sud de l'Europe, elle peut être à l'origine de fortes pertes de récolte et compromettre la pérennité des vignobles.

Cette maladie est causée par le phytoplasme de la Flavescence dorée : une petite bactérie sans paroi de la classe des Mollicutes. Elle provoque une obstruction des vaisseaux conducteur de sève. Elle est transmise par un insecte vecteur, la cicadelle *Scaphoideus titanus* ainsi que par le greffage.



Photo FREDON CVL et INRAE – D. Blanchard – Enroulement et décoloration du feuillage sur cépage rouge (gauche) et blanc (droite) dus à la flavescence dorée.

En tant que maladie de quarantaine, la Flavescence dorée fait l'objet d'une lutte réglementée et obligatoire.

Les symptômes sont **maintenant** visibles :

- **durcissement** du limbe des feuilles,
- **enroulement** des feuilles,
- **absence d'aoûtement** (lignification) du bois,
- **rougissement** (cépage rouge) ou **jaunissement** (cépage blanc) d'une partie du feuillage.
- **dépérissement** et/ou **flétrissement** des grappes

Plus d'informations en cliquant le dossier Flavescence Dorée sur le site de FREDON CVL :

[FREDON CVL - la flavescence-doree](http://www.fredoncvl.fr/la-flavescence-doree)

ou sur le site ephytia de l'INRAE

<http://ephytia.inra.fr/fr/C/6070/Vigne-Phytoplasme-de-la-flavescence-doree>



Financé par

ARBRES, ARBUSTES ET PLANTES D'ORNEMENT

Buis

Pyrale du buis (*Cydalima perspectalis*) - Chenille

Quelques rares signalements de chenilles en Indre et Loire ces dernières semaines, pour les autres départements pas de chenilles observées.

Symptômes, biologie ...



[Retrouvez plus d'infos dans notre rubrique "Espèces Exotiques Envahissantes"](#)

Photo : FREDON CVL – présence d'une chenille de pyrale en train de consommer une feuille de buis.



Méthodes de lutte et biocontrôle

- Elimination des dernières chenilles à la main pour de petites surfaces de buis et des arbustes isolés.
- En cas d'infestation importante, un traitement à base de produits de biocontrôle type BT (*Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*) peut être envisagé. Eviter de traiter en période humide mais également sous forte chaleur. Se référer à la notice d'utilisation du produit.



Photo : FREDON CVL – présence d'une chenille de pyrale morte d'aspect desséché suite à une pulvérisation de Bacille de Thuringe.



Pyrale du buis (*Cydalima perspectalis*) -Papillon

Dans notre région, un groupe de jardiniers bénévoles surveille les papillons de la pyrale du buis à l'aide de pièges à phéromones. 1 ou plusieurs pièges à phéromones sont disposés dans les jardins à proximité des buis et un comptage hebdomadaire est assuré afin de vérifier la présence (ou l'absence) et le nombre de papillons piégés. Ces données permettent de cibler d'éventuels pics de vol et donc de mieux positionner vos interventions sur les chenilles.


Sites d'observation	
Indre et Loire	Rochecorbon
	Fondettes x2
Indre	Buzançais
Loir et Cher	Mazangé
Eure et Loir	Chartres
Cher	Méreau

Photo FREDON CVL : – Papillons mâles de pyrale du buis capturés dans un piège à phéromone.



Actuellement, 6 sites de piégeage sont en place en région Centre-Val de Loire.

Financé par



Très peu de captures sur ces 3 dernières semaines en région Centre Val de Loire.

Le vol semble ralentir. Toutefois méfiance : la surveillance est encore de mise avec cette année particulière.

Méthodes de lutte et biocontrôle

Les lâchers de trichogrammes (hyménoptères parasitoïdes oophages) ont donné de bons résultats. Leur mobilité est assez faible à partir des points de lâcher (environ 40 cm) donc cette méthode est plutôt adaptée à la protection des buis isolés ou topiaires.

À effectuer dès la capture des premiers papillons mâles en piège phéromonal.

Rosier

Maladies et ravageurs

Les rosiers apprécient le retour à des températures plus clémentes.

Hortensia

Grillures florales

De nombreux hortensias ont eu des brûlures de fleurs et une croissance ralentie. La floraison de l'année prochaine est fortement compromise car les futurs bourgeons floraux sont peu développés.

Hortensia - Agrumes

Cochenilles

Les températures importantes ont été favorables au développement des populations de cochenilles sur les hortensias et sur les agrumes. La production de miellat par les cochenilles et la présence de fumagine détériore la qualité esthétique des plantes touchées.

Pour les citrus, plusieurs espèces de cochenilles peuvent se développer sur les pieds.

Symptômes, biologie ...



[Retrouvez plus d'infos sur la cochenille pulvinaire ici](#)

[Retrouvez plus d'infos sur la cochenille du citronnier *Planococcus citri* ici](#)



Photo DGAI – J. Jullien :
Cochenilles pulvinaires



Photo Adans - USA :
Cochenilles planococcus
citri sur Kalanchoe

Méthodes de lutte et biocontrôle

- Elimination des cochenilles manuellement en les écrasant et en recherchant minutieusement tous les individus.
- **Utiliser des produits de biocontrôle** pour lutter contre les cochenilles.

Hortensia

Brûlure

Des brûlures de feuilles ou de fleurs d'Hydrangea quelle que soit les espèces ont été importantes sur la région. Les forts ensoleillements sont trop agressifs pour les plantes de mi-ombre même si l'Hydrangea peut être mis au soleil. Le rajout de voiles d'ombrage peut limiter les « coups de soleil ».



DOSSIER TECHNIQUE

Goesmithia morbida



La maladie des mille chancres du noyer

Geosmithia morbida



Cette maladie provoquée par le champignon *Goesmithia morbida*, affecte principalement le noyer noir mais peut s'attaquer au noyer commun.

Ce champignon est un pathogène de blessure. Il a besoin d'être introduit dans les plaies et blessures. Il est véhiculé par un scolyte, *Pityophthorus juglandis*, qui disperse les spores accrochées à son corps dans les galeries qu'il creuse dans l'écorce et le bois de noyer.

Le bois autour des galeries développe des chancres. Le champignon se propageant autour de chacune de ces galeries, de très nombreux chancres se forment, d'où son nom :

« Maladie des mille chancres ».



Pour en savoir plus, cliquer sur l'image pour consulter le dossier technique

Financé par

VIGILANCE SUR ...



Le Datura stramoine

Datura stramonium



© C. Lenormand

Une note nationale a été publiée en février 2025 ayant pour sujet le **Datura Stramoine** (*Datura stramonium*).

Les *Datura* se développent dans les zones perturbées (les bords de routes, les fossés, les bords de rivières, les friches et les cultures). Toutes les espèces sont **extrêmement toxiques** car elles contiennent des alcaloïdes très puissants qui peuvent provoquer des intoxications très graves, même en très petites quantités. En agriculture, *D.stramonium* est une adventice qui peut être problématique, surtout dans les cultures estivales, ainsi que dans les cultures destinées aux conserves en raison de sa toxicité.

Vous pourrez retrouver la note nationale en cliquant sur le lien suivant : [lien Internet DRAAF](#).

Pour plus d'informations sur les différentes espèces de Datura, cliquez sur le lien suivant : [lien Internet DRAAF vers le dossier des fiches espèces Datura](#)

VIGILANCE SUR ...

Le Scarabée japonais – *Popillia japonica*

Votre SRAL Centre-Val de Loire souhaite vous informer sur la potentielle dangerosité d'un coléoptère, le scarabée japonais. Il s'agit d'un organisme réglementé non présent dans notre région mais qu'il convient de surveiller rigoureusement.

Savoir le reconnaître et anticiper son arrivée est indispensable pour la préservation de nos filières végétales et nos jardins.

Plus d'infos en cliquant sur la photo



Financé par

VIGILANCE SUR ...

L'Ambroisie – *Un enjeu de santé publique*

L'ambroisie est une plante invasive dont le pollen est fortement allergisant, provoquant rhinites, conjonctivites, asthme... La lutte contre son expansion est l'affaire de tous. Chacun peut agir à son niveau :




- *Sur ma propriété : je l'arrache !*
- *Hors de ma propriété, sur un terrain public, s'il n'y a que quelques plants : je l'arrache !*
- *Hors de ma propriété, si la zone est fortement infestée : je la signale !*

Que faire en cas de découverte ?

Signalez la présence d'ambroisie [sur la plateforme nationale signalement Ambroisie](#) ou directement par le biais de l'application mobile « Signalement-Ambroisie »

Chaque signalement nous aide à être plus efficace.

Plus d'infos en cliquant sur la photo



Financé par



AUXILIAIRES

Pour aller plus loin : consulter les notes nationales de biodiversité actuellement disponibles



Ce bulletin est publié à partir d'observations ponctuelles ou régulières, réalisées par un réseau d'épidémiosurveillance en jardins, espaces végétalisés et infrastructures (JEVI). S'il donne une tendance de la situation phytosanitaire régionale la plus représentative et objective possible, il reste nécessaire pour chaque gestionnaire de JEVI de considérer également le résultat de ses propres observations. Les informations contenues dans ce bulletin ne peuvent être transposées telles quelles à d'autres situations. Elles permettent de donner des tendances d'évolutions phytosanitaires à l'échelle de petites régions. FREDON Centre Val de Loire dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les gestionnaires d'espaces vert, jardiniers amateurs ou détenteurs de végétaux sur la base des informations communiquées dans ce bulletin.

Observations : Ce bulletin est rédigé grâce aux observations des jardiniers, issues de toute la région Centre-Val de Loire, des associations d'horticulture (Sociétés d'Horticulture 37-41-45-18-36-28), de l'APJRC (Association des Parcs et Jardins de la région Centre-Val de Loire, de jardins familiaux (AOJOF), de villes (Tours, Orléans), de châteaux, du Centre des Monuments Nationaux.

Animation : Cyril KRUCZKOWSKI - FREDON Centre Val de Loire

Rédaction : Monique CHARLOT – Marie-Pierre DUFRESNE - FREDON Centre Val de Loire

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée avec la mention « extrait du BSV JEVI « La Santé des jardins et Espaces Végétalisés - région CVL »

Renseignements : bulletinjevi@fredon-centrevaldeloire.fr

Financé par