

Martinique

Cultures Fruitières

N°9 - 1er au 30 Septembre
2024



Animateurs inter-filières :

Teddy OVARBURY (FREDON Martinique)
Jacques-Edouard EUGENIE (FREDON Martinique).

Animateurs filières :

Jacques-Edouard EUGENIE (FREDON Martinique)
Teddy OVARBURY (FREDON Martinique)

Crédit photos :

FREDON Martinique (sauf mention contraire)

PRÉVISION SAISONNIÈRE d'octobre à décembre

- Normal à légèrement plus pluvieux que d'ordinaire
- Températures un peu plus élevées

SYNTHÈSE À LA STATION DE RÉFÉRENCE DU LAMENTIN

28,9°C

Sur 27,9°C
attendus



-1h40



413,6 mm

Sur 219,3 mm
attendus



9,36 km/h

Sur 10,8 km/h
habituellement

MOUCHE DES FRUITS



Pression élevée: Forte pression sur les communes de Saint-Pierre et Morne-Rouge.

CHANCRE CITRIQUE



- **Pression faible** : 2 détections de chancre citrique sur 10 observations ce mois-ci.
- Risque de propagation moyen pour le mois à venir

GREENING (HLB)



- **Pas de détection** pour ce mois

FOCUS

Pas de focus pour ce mois.



Vergers - Mouche des Fruits (*Anastrepha obliqua*)

OBSERVATIONS

Tableau du nombre de relevés et de captures d'*Anastrepha obliqua* par commune

Communes	Nombre de pièges	Nombre de relevés de pièges	Nombre de captures	Nombre de captures rapporté au nombre de relevés
Case-Pilote	4	8	0	0,00
Fort-de-France	8	16	0	0,00
Le Carbet	2	4	0	0,00
Le Lamentin	20	40	8	0,20
Le Marin	4	8	0	0,00
Le Morne-Rouge	4	8	164	20,50
Le Robert	12	24	7	0,29
Les Trois-Ilets	4	8	0	0,00
Rivière-Pilote	8	16	2	0,13
Sainte-Anne	4	8	0	0,00
Sainte-Marie	4	8	0	0,00
Saint-Esprit	4	8	2	0,25
Saint-Joseph	4	8	0	0,00
Saint-Pierre	4	8	5	0,63
Total	86	172	188	1,09

Dans les Petites Antilles, la mouche des fruits *Anastrepha obliqua* affecte essentiellement les goyaves sucrées. Les dégâts qu'elle occasionne sont généralement limités. Sa pression est suivie grâce au réseau de surveillance des mouches de fruits, qui vise à prévenir l'installation d'autres espèces de mouches des fruits. Ce réseau compte 22 sites répartis sur l'ensemble de l'île, dont 11 en vergers. Sur chaque site, 4 pièges sont installés et relevés 2 fois par mois. Chaque piège est doté d'un attractif différent.

ANALYSE DE RISQUE

1,09

mouches capturées
par relevé en
moyenne

Le nombre moyen de mouche capturée lors de la relève d'un piège est de **1,09**, ce qui présente une **pression élevée** en Martinique. On relève une moyenne de capture de mouches des fruits plus élevée à Morne-Rouge et à Saint-Pierre.

Légende :

	Pas de données
0	Pression nulle
0,01 - 0,25	Pression faible
0,26 - 0,50	Pression moyenne
> 0,50	Pression forte

	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	sept-24
Mouche des fruits (<i>Anastrepha obliqua</i>)					0,14	0,03	0,05			0,01	0,01	0,07	1,09

GESTION DU RISQUE

Pour prévenir l'augmentation des populations de mouches des fruits, il convient de :

- Favoriser ou maintenir un enherbement permanent au sol (cela contribue à la destruction du stade nymphal de ce bio-agresseur qui se déroule au sol)
- Limiter les traitements phytopharmaceutiques qui sont défavorables à la faune utile.

Agrumes - Chancre citrique⁽¹⁾

(*Xanthomonas citri*)

OBSERVATIONS ET ANALYSE DE RISQUE

Un total de

2

détections
sur 10 observations

PRESSION FAIBLE

RISQUE DE PROPAGATION
MOYEN

Pluies normales à légèrement supérieures et un peu plus chaud. Ce climat est favorable à la bactérie.

Le chancre citrique est une maladie bactérienne affectant fortement les rendements et la qualité des agrumes. Elle fait l'objet d'une surveillance et d'une lutte obligatoire conduites par la DAAF et FREDON Martinique dans le cadre de la Surveillance des Organismes Réglementés et Émergents (SORE).

Effort de prospection : 10 observations ont été réalisées. La maladie n'a été détectée qu'au Nord de l'île (Lorrain, Basse-ointe). Quelques agrumes symptomatiques ont été prélevés au Morne-Rouge, en attente de confirmation.

Dernières détections confirmées par analyse : Les précédentes détections datent de juillet 2024 (1/29).

Analyse de risque : La saison des pluies présente un **risque moyen** de contamination.

Evolution de la fréquence de détection sur un an

	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	sept-24
Chancre citrique (<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i>)					33%	17%	0%	1%	43%	1%	3%	0%	20%

Légende :

	Pas de données
0%	Pression nulle
0%-25%	Pression faible
25%-50%	Pression moyenne
> 50 %	Pression forte

GESTION DU RISQUE

Mesures prophylactiques

- Désinfecter les outils de taille
- Acheter les plants dans des pépinières professionnelles contrôlées
- Éviter de toucher les plants malades par temps pluvieux
- Éviter les échanges de plants

(1) : *Xanthomonas citri* est un organisme réglementé pour la Martinique. Voir arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire.

Agrumes - HLB⁽²⁾

(*Candidatus Liberibacter spp.*)

OBSERVATIONS ET ANALYSE DE RISQUE

Le HLB ou greening des agrumes est une maladie bactérienne qui atteint le système vasculaire de la plante et qui peut conduire à sa mort. Elle fait l'objet de la **Surveillance des Organismes Réglementés et Émergents** (SORE) conduite par la DAAF et FREDON Martinique.

Effort de prospection : **5 observation** a été réalisée sur les communes de Basse-Pointe, Morne-Rouge, Lorrain et Trois-îlets avec **0 détection (0/5)**.

Dernières détections confirmées par analyse : Les précédentes détections datent du **mois de juillet avec 1 détection sur 10 observations (1/10)** au Morne-rouge.

Analyse de risque : Les données collectées ce mois ne permettent pas d'évaluer le risque de contamination. Cependant, il faut garder à l'esprit que la maladie est maintenant largement répandue sur le territoire.

GESTION DU RISQUE

En cas de suspicion de la maladie (jaunissement de toutes les feuilles d'un seul secteur de l'arbre et/ou présence de petits fruits asymétriques), il ne faut pas hésiter à contacter FREDON Martinique pour obtenir un prélèvement et une confirmation de la présence de la maladie.



En cas de cas avéré, la lutte et l'assainissement contre cette maladie repose sur 3 leviers :

- la lutte contre son vecteur, le pssyle asiatique des agrumes (*Diaphorina citri*)
- la lutte contre les foyers infectieux via l'abattage des pieds d'agrumes infectés - à savoir que les buis de Chine peuvent être porteurs sains
- l'utilisation de plants sains, issus de pépinières qualifiées.

(2) : *Candidatus Liberibacter spp.* est un organisme réglementé pour la Martinique. Voir arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire.

Les abeilles butinent, protégeons les !

Respectez les bonnes pratiques phytosanitaires

1

Les traitements insecticides et/ou acaricides sont interdits, sur toutes les cultures visitées par les abeilles et autres insectes pollinisateurs, pendant les périodes de floraison et de production d'exsudats.

2

Par dérogation, certains insecticides et acaricides peuvent être utilisés, en dehors de la présence des abeilles, s'ils ont fait l'objet d'une évaluation adaptée ayant conclu à un risque acceptable. Leur autorisation comporte alors une mention spécifique "emploi autorisé durant la floraison et/ou au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles".

3

Il ne faut appliquer un traitement sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scrupuleusement les conditions d'emploi associées à l'usage du produit, mentionnées sur la brochure technique (ou l'étiquette) livrée avec l'emballage de la spécialité commerciale autorisée.

4

Afin d'assurer la pollinisation des cultures, de nombreuses ruches sont en place dans ou à proximité des parcelles en fleurs. Il faut veiller à informer le voisinage de la présence de ruches. Les traitements fongicides et insecticides qui sont appliqués sur ces parcelles, mais aussi dans les parcelles voisines, peuvent avoir un effet toxique pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs. Il faut éviter toute dérive lors des traitements phytosanitaires.

Abeille charpentière
(*Xylocopa fimbriata*)
sur agrume

Retrouvez plus d'information dans la [note nationale Abeilles & Pollinisateurs](#) qui propose une synthèse d'informations actualisées pour la protection des insectes pollinisateurs et relative à la réglementation sur les produits phytopharmaceutiques.



Ce bulletin est basé sur des observations ponctuelles qui donnent une tendance de la situation sanitaire territoriale.
 La Chambre d'Agriculture de la Martinique encourage les agriculteurs à réaliser leurs propres observations sur leurs parcelles.
 Elle se dégage de toute responsabilité quant aux décisions prises.

Action du plan ECOPHYTO piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité.

