Bulletin de Santé du Végétal
Nouvelle-Aquitaine

Maraîchage

N°01
06/03/2025

CHAMBRE D'AGRICULTURE NOUVELLE-AQUITAINE

Animateur filière

Louise FURELAU-MEYNIER
FREDON N-A
louise.furelau@fredon-na.fr

Directeur de publication

Luc SERVANT
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée. Reproduction partielle autorisée avec la mention « extrait du bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Maraîchage Edition Sud NA N°01 du 06/03/2025 »

ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER L'UTILISATION DES PHYTOS

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL ÉCOPHYTO

Edition Sud Nouvelle-Aquitaine
Départements 19/24/33/40/47/64

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT en cliquant sur Formulaire d'abonnement au BSV

*Consultez les **évènements agro-écologiques** près de chez vous !*

Ce qu'il faut retenir

Situation météorologique (cliquer ici pour accéder au paragraphe)

Le **tableau** ci-dessous récapitule le risque de la semaine passée et à venir **pour chaque bioagresseur** selon ce code couleur :

Très Faible	Faible	Modéré	Fort	Très Fort

Tomates

Bioagresseur	Semaine passée	Semaine à venir
Botrytis cinerea		
Mildiou		
Acariose		

Poivron/piment

Bioagresseur	Semaine passée	Semaine à venir
Oïdium		
Chenilles défoliatrices		

Produits de biocontrôle
Consultez la note de service DGAL/SDSPV ici. Cette note établit la liste des produits de biocontrôle comprenant les micro-organismes, les substances naturelles, les médiateurs chimiques et les pièges à insectes. Pour les macro-organismes, respecter les conditions optimales de développement de chaque auxiliaire.

De manière générale et pour toutes les cultures, observez et soyez vigilant quant à la conservation de vos auxiliaires naturels dans vos stratégies de protection des cultures.

Situation générale

Entretien des cultures : Les cultures sont bien en place sous serres chauffées.

Situation météorologique

Les températures moyennes de ces deux dernières semaines ont globalement été équivalentes voire légèrement supérieures aux normales de saison (1 à 5°C de plus que la moyenne par secteur), excepté du 26 février au 3 mars où elles sont descendues en dessous des 8°C (jusqu'à 5°C par endroit). Les minimales étaient comprises entre -3 et 10°C et les maximales entre 10 et 22°C.

Les taux d'hygrométrie de ces deux dernières semaines ont été moins importants que d'habitude, ne marquant ainsi que certains secteurs par d'assez brèves précipitations (apportant de 3 à 13 mm par endroit, surtout en Lot-et-Garonne).

A partir de dimanche et ce jusqu'à mercredi prochain, nous retrouverons de la grisaille ainsi que de fortes averses. Néanmoins nous devrions retrouver par la suite un ciel dégagé ainsi que des éclaircies sur la majeure partie de la région Nouvelle-Aquitaine.

Prévision du 6 au 12 mars 2025 *(source : Météo France)*

Station	Prévisions pour les 7 jours à venir :						
	JEUDI 06	VENDREDI 07	SAMEDI 08	DIMANCHE 09	LUNDI 10	MARDI 11	MERCREDI 12
Agen (47)	7° / 21° ➤ 25 km/h	9° / 20° ➤ 25 km/h	10° / 20° ➤ 40 km/h	9° / 15° ➤ 20 km/h	6° / 15° ➤ 10 km/h	5° / 15° ➤ 10 km/h	5° / 10° ➤ 15 km/h
Podensac (33)	7° / 21° ➤ 20 km/h	9° / 21° ➤ 25 km/h	11° / 21° ➤ 30 km/h	11° / 15° ➤ 10 km/h	5° / 16° ➤ 15 km/h	4° / 17° ➤ 15 km/h	5° / 11° ➤ 20 km/h
Bassillac (24)	2° / 20° ➤ 20 km/h	7° / 19° ➤ 20 km/h	11° / 20° ➤ 30 km/h	10° / 13° ➤ 20 km/h	5° / 16° ➤ 10 km/h	3° / 16° ➤ 10 km/h	3° / 9° ➤ 15 km/h

Tomates

➔ Les observations sur cette culture ont été réalisées sur plusieurs exploitations de tomates sous serre en Lot-et-Garonne.

Maladies

- ***Botrytis cinerea* (pourriture grise)**

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : On resence la présence de ce champignon parasite sur plus d'1/4 des exploitations suivies. L'intensité d'attaque enregistrée varie quant à elle de très faible à moyenne selon les parcelles.

Evaluation du risque : Le risque de développement du *Botrytis* est actuellement **moyen**. Il convient toutefois de surveiller vos serres et en particulier celles plantées avec des variétés sensibles.

Méthodes prophylactiques
- Enlever les parties contaminées.
- Choisir des variétés tolérantes ou résistantes au *Botrytis* et pratiquer la rotation des cultures.
- Eliminer les débris végétaux (feuilles, fruits non récoltés…) régulièrement.
- Une bonne maitrise du climat est primordiale afin d'éviter les excès d'humidité et de condensation sous abris : Aérer les cultures en effeuillant et en respectant les densités de plantation.

- **Mildiou (*Phytophtora infestans*)**

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Du mildiou a été observé sur quelques-unes des parcelles suivies et l'intensité d'attaque sur les plants a également été très faible, surtout en sortie de pépinières.

Taches de mildiou sur feuilles en serre (Crédit photo : L. FURELAU-MEYNIER – FREDON NA)

Evaluation du risque : Le risque est encore **très faible** cette semaine. Restez vigilants et observez régulièrement vos parcelles.

Méthodes prophylactiques
- Aérer les abris
- Maintenir un bon désherbage.

Ravageurs

- **Acariose bronzée** (causée par *Aculops lycopersici)*

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : La fréquence d'observation des symptômes, à l'instar de l'intensité des dégâts est très encore très faible dans ce secteur.

Symptômes d'acariose bronzée sur fruit et feuilles en serre

(Crédit photo : A. NAULLET – Chambre d'Agriculture de la Gironde)

Evaluation du risque : Restez vigilants et observez vos parcelles, même si le risque relatif est pour le moment estimé **très faible**.

Méthodes prophylactiques
- Maintenir la serre propre, sans adventices
- Limiter la présence de plantes hôtes (liseron, morelle, datura…) à proximité de la serre.
- Eliminer les déchets de cultures régulièrement
- Mettre en place un nettoyage complet en fin de culture
- Une détection précoce est indispensable pour gérer ce ravageur

- **Aleurodes**

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : La présence d'**aleurodes** est signalée depuis le mois de février sur de rares ateliers concernés du secteur. La gravité des dégâts causés est là encore très faible pour le moment.

Seuil indicatif de risque : Au-dessus de 100 aleurodes par plante.

Evaluation du risque : Cette semaine le risque est **très faible**. Pour rappel, les aleurodes sont vecteurs de virus. *Bemisia tabaci* véhicule le virus ToLCNDV (*Tomato Leaf Curl New Dehli Virus*) et le ToCV (*Tomato Chlorosis Virus*).

Méthodes prophylactiques : Détecter les premiers individus à l'aide de plaques jaunes engluées.

B

Produits de biocontrôle : Faire des lâchers d'auxiliaires tels que Encarsia formosa, Macrolophus pygmaeus et Eretmocerus eremicus.
Renseignez-vous sur les conditions optimales de développement de chaque auxiliaire.

- **Autres bioagresseurs**

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : La présence d'individus supplémentaires tels que des punaises où encore des cochenilles a également été signalée mais de manière très ponctuelle.

Poivron/Piment

➔ Les observations sur ces cultures ont été réalisées sur plusieurs exploitations en Lot-et-Garonne.

Maladies

- **Oïdium**

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Des signalement de taches blanchâtres caractéristiques sont déjà signalées depuis plusieurs semaines sur la totalité des parcelles surveillées du secteur. La gravité des dégats est quant à elle assez variable, pouvant ainsi passer de moyenne à forte par endroit (< 1/4 de plants touchés / atelier).

Evaluation du risque : Le risque d'évolution significative pour ce bioagresseur est plutôt **élevé**, d'autant plus avec les températures prévues dans les prochaines semaines. Restez vigilants !

Ravageurs

- **Chenilles défoliatrices**

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Des populations ont été repérées là aussi sur l'ensemble des exploitations suivies. Aucun dégât n'est encore à déplorer.

Evaluation du risque : Bien que leur présence soit généralisée, le risque relatif à ces individus est toujours estimé **faible**.

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Maraîchage / Edition Sud Nouvelle-Aquitaine sont les suivantes : *Parcelles flottantes :*
Cadralbret, CDA 47, ATFL Gironde, CA33, FREDON Nouvelle-Aquitaine, Bio Pays Landais, INVENIO, EPLEFPA de Ste Livrade, Midi Agro Consultant, Scaafel / Belloc Sud-Ouest, Valprim, VDL, Vitivista, Terre du Sud, Koppert, Syndicat du Piment d'Espelette, Agrobio 40, Agrobio Périgord, Agrobio 33, CIVAM Bio du Pays Basque, CIVAM Bio du Béarn, Bio Pays Landais, Top Légumes, Vallée du Lot, Biobest, ALCOR Agro-Solutions, CTIFL Lanxade, La Ceinture Verte de Pau, La Ceinture Verte Nouvelle-Aquitaine
+ agriculteurs et observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

" Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité ".